

## VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

### 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PVP JOD, odos purškalas, tirpalas

### 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:

#### veikliosios medžiagos:

joduoto povidono 100 mg;

pagalbinių medžiagų iki 1 ml.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

### 3. VAISTO FORMA

Odos purškalas, tirpalas.

### 4. KLINIKINIAI DUOMENYS

#### 4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Visų rūšių gyvūnai.

#### 4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Operacijos laukui (pvz., kastracijos pjūvio, injekcijos vietai), lytiniams organams ar naujagimių bambosvirkštelei dezinfekuoti.

Vaistu galima trumpą laiką dezinfekuoti spenių ir tešmens paviršių.

Tinka rankoms ir paviršiams dezinfekuoti.

#### 4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti padidėjus jautrumui jodui bei gyvūnams, sergantiems hipertiroidizmu ar kitomis skydliaukės ligomis.

#### 4.4. Specialieji nurodymai

Negalima purkšti aplink ir į akis.

#### 4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

##### Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra.

##### Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Nėra.

#### **4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)**

Jautriems gyvūnams gali pasireikšti alerginės reakcijos.

#### **4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu**

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

#### **4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos**

Vaistui patekus į sisteminę kraujotaką, gali būti slopinamas antikoaguliantų veikimas. Skiriant kartu su ličio druskomis, gali padidėti hipotirodizmo pavojus.

#### **4.9. Dozės ir naudojimo būdas**

Prieš naudojimą suplakti. Vaistą reikia purkšti ant nedidelio norimo dezinfekuoti paviršiaus 20–30 cm atstumu. Svarbu, kad užpurkštas tirpalas nenutekėtų nuo užpurkštos vietos.

#### **4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina**

Gausiai užpurkštas jodas gali absorbuotis į sisteminę kraujotaką. Tai gali turėti poveikį skydliaukei.

#### **4.11. Išlauka**

Skerdienai ir pienui – 0 parų.

### **5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS**

Farmakoterapinė grupė: antiseptinės medžiagos.  
ATCvet kodas: QD08AG02.

Iš joduoto povidono palaipsniui atsipalaiduojantis jodas neselektyviai oksiduoja mikroorganizmų baltymus. Joduotas povidonas yra plataus veikimo spektro baktericidinė medžiaga. Jai yra jautrios gramteigiamos ir gramneigiamos bakterijos, kai kurie anaerobiniai mikroorganizmai, mielės, mikroskopiniai grybai, jų sporos, pirmuonys ir kai kurie virusai. Vaistas gerai veikia patogeninius mikroorganizmus, pvz., stafilokokus, pūliavimą sukeliančius streptokokus, fuziformines bakterijas, mikobakterijas ir bakteroidus. Veikiami vaisto mikroorganizmai netenka gyvybingumo per 2–5 min., o žūva per 5 min.

### **6. FARMACINIAI DUOMENYS**

#### **6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas**

Lauromakrogolis, propilenglikolis, denatūruotas etanolis, natrio citrato dihidratas, išgrynintas vanduo.

#### **6.2. Nesuderinamumai**

Naudojant su tam tikrais vaistais (dėl koncentracijos, pH, temperatūros ir šviesos) gali būti fizinis nesuderinamumas.

#### **6.3. Tinkamumo laikas**

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.

#### **6.4. Specialieji laikymo nurodymai**

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

#### **6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys**

Plastikiniai buteliukai su mechaniniu purkštuvu po 100 ml.

Polietileniniai buteliai su dangteliu po 1 000 ml.

Slėginiai balionėliai po 200 ml.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

#### **6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

### **7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS**

Bioveta a.s.,  
Komenskeho 212,  
683 23 Ivanovice na Hane,  
Čekijos Respublika

### **8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI**

LT/2/99/0938/001-003

### **9. REGISTRACIJOS/PERREGISTRACIJOS DATA**

1999-09-23 / 2005-03-03 / 2010-02-19

### **10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA**

2010-02-10

## ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS\*

\* informacinis lapelis atskirai nepridedamas, todėl visa informacija pateikiama ant etiketės

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS**

**BUTELIUKAS, BUTELIS, SLĖGINIS BALIONĖLIS**

### 1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bioveta a.s.,  
Komenskeho 212,  
683 23 Ivanovice na Hane,  
Čekijos Respublika

### 2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

PVP JOD, odos purškalas, tirpalas

### 3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

#### veikliosios medžiagos:

joduoto povidono 100 mg;

**pagalbinių medžiagų:** lauromakrogolio, propilenglikolio, denatūruoto etanolio, natrio citrato dihidrato, išgryninto vandens.

### 4. INDIKACIJOS

Operacijos laukui (pvz., kastracijos pjūvio, injekcijos vietai), lytiniams organams ar naujagimių bambosvirkštelei dezinfekuoti.

Vaistu galima trumpą laiką dezinfekuoti spenių ir tešmens paviršių.

Tinka rankoms ir paviršiams dezinfekuoti.

### 5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti padidėjus jautrumui jodui bei gyvūnams sergantiems hipertiroidizmu ar kitomis skydliaukės ligomis.

### 6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Jautriems gyvūnams gali pasireikšti alerginės reakcijos.

Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

## **7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS**

Visų rūšių gyvūnai.

## **8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI**

Tik išoriniam naudojimui. Vaistą reikia purkšti ant nedidelio norimo dezinfekuoti paviršiaus 20–30 cm atstumu. Svarbu, kad užpurkštas tirpalas nenutekėtų nuo užpurkštos vietos.

Buteliukui su purškikliu papildyti. (TEKSTAS ANT 1 000 ml BUTELIO)

## **9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO**

Prieš naudojimą suplakti. Nepurkšti aplink ir į akis.

## **10. IŠLAUKA**

Skerdienai ir pienui – 0 parų.

## **11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI**

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

## **12. SPECIALIEJI NURODYMAI**

Stengtis, kad vaisto nepatektų į akis.

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

Vaistui patekus į sisteminę kraujotaką, gali būti slopinamas antikoagulantų veikimas. Skiriant kartu su ličio druskomis, gali padidėti hipotirodizmo pavojus.

Naudojant su tam tikrais vaistais (dėl koncentracijos, pH, temperatūros ir šviesos) gali būti fizinis nesuderinamumas.

## **13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## **14. TEKSTO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA**

2010-02-19

## **15. KITA INFORMACIJA**

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

**16. VAISTO FORMA**

Odos purškalas, tirpalas.

**17. PAKUOTĖS DYDIS**

100 ml

1000 ml

200 ml

**18. TINKAMUMO DATA**

Tinka iki {mėnuo/metai}

**19. NUORODA „VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI**

Veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

**20. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)**

LT/2/99/0938/001

LT/2/99/0938/002

LT/2/99/0938/003

**21. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS**

Ser. Nr. {numeris}