

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIO KILL 2,5 mg/ml odos purškalkas, emulsija

2. KOKYBIN IR KIEKYBIN SUD TIS

1 ml yra:

veikliosios medžiagos:

permetrino 2,5 mg;

pagalbin s medžiagos:

benzilo alkoholio 10 mg.

Išsam pagalbin medžiag s raš žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Odos purškalkas.

Balkšva emulsija.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyv n r šys

Šunys, j r kiaulyt s, žiurk nai, triušiai, egzotiniai paukš iai, arkliai, avys, naminiai paukš iai.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyv n r šis

Šun , j r kiauly i , žiurk n , triuš i , egzotini paukš i , arkli , avi ir namini paukš i ektoparazitams (blusoms, ut l ms, erk ms) bei vabzdžiams (skruzd l ms, mus ms, vorams) naikinti. Galima naudoti guoliams ir lizdams dezinfekuoti.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti kat ms. Vengti bet kokio ka i kontakto su šunimis, kurie buvo gydyti BIO KILL 2,5 mg/ml purškalku.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskir r ši paskirties gyv nams

N ra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemon s

Specialios atsargumo priemon s, naudojant vaist gyv nams

N ra.

Specialios atsargumo priemon s asmenims, naudojantiems vaist gyv nams

Vaistas gali dirginti od ir gleivin . Tod l reikia saugotis, kad vaisto nepatekt ant odos, aki ir gleivin s. Vaistui patekus ant odos ar gleivin s, nedelsiant reikia plauti dideliu kiekiu vandens ir nusivilkti užterštus drabužius, kurie tiesiogiai lie iasi su oda. Vaistui patekus akis, jas reikia skalauti

dideliu kiekiu vandens. Jei pasireiškia dirginimo simptomai (bėrimas), alerginė reakcija ar sisteminės reakcijos, reikia kreiptis gydytoj .

Vaistas gali dirginti kvėpavimo takus, todėl jį naudoti galima tik gerai vėdinamose patalpose.

Atsitiktinai kvėpuojantiems būtina išėiti gryną orą. Pasunkėjus kvėpavimui ar pasireiškus sisteminiams poveikiui (galvos svaigimui, galvos skausmui, nuovargiui, smarkiame širdies plakime ir t. t.), reikia kreiptis gydytoj .

Po vaisto naudojimo rekomenduotina iki 12–24 val. vengti kontakto su gydytais gyvūnais, negalima su jais miegoti. Net ir praėjus šiam laikui, po kontakto su gydytais gyvūnais būtina visada kruopščiai nusiplauti rankas. Būtina saugoti vaikus nuo kontakto su gydytais gyvūnais iki 24 val.

Naudojant vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės (respiratorius, apsauginiai rėmai, akiniai, neopreninės pirštinės). Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis gydytoj ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Žmonėms, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas permetrinui, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

Vaistas neturi tiesiogiai liestis su maistu, geriamuoju vandeniu, vaikų žaislais.

Negalima purkšti akvariumus ar vandens telkinius, nes preparatas toksiškas žuvisms, ropliams ir bitėms.

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimui – žr. p. 6.6.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinoma.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingumo ar laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos veikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozavimas ir naudojimo būdas

Naudojimo būdas:

Gyvūnų ektoparazitams naikinti vaistą reikia purkšti tiesiai ant kailio ar plunksnų kol sudrėks. Jei gyvūno plaukai ilgi, purškimo metu rekomenduotina šukuoti.

Dozavimas: 10 mg permetrino (4 ml vaisto) 1 kg kūno svorio, t.y., 100 ml buteliuko purkštuko 20 paspaudimų arba 500 ml buteliuko purkštuko 4 paspaudimai 1 kg kūno svorio.

Naudojant patalpose, narvus, guolius, gardus ar tvartus reikia purkšti kol taps drėgni, t.y., apie 25 ml/m² (100 ml buteliuko purkštuko 125 paspaudimai arba 500 ml buteliuko purkštuko 25 paspaudimai). Prireikus galima purkšti pakartotinai po 1–2 sav.

Prieš naudojimą suplakiti!

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Nežinoma.

4.11. Išlauka

Nenumatyta.

Neregistruota naudoti produkcijos gyvūnams.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBOS

Farmakoterapinė grupė: insekticidinės medžiagos, piretrinai ir piretroidai.
ATCvet kodas: QP53AC04.

Vaisto sudėtyje yra sintetinio piretroido – permetrino, kuris naudojamas ant odos ir vietiškai veikia antiparazitiškai. Permetrinas veikia parazitų nervų skaidulų jonų kanalus, sutrikdo Na^+ ir K^+ jonų transportavimą per neuronų membranas, todėl sukelia depolarizaciją, didina išsiskiriamą neuromediatorių kiekį ir sukelia ekto-parazitų neurorauumeninį blokadą. Naikina suaugusius ekto-parazitus.

Permetrinas nėra toksiškas žinduoliams (išskyrus kates) ir paukščiams, bet toksiškas žuvims, bitėms ir ropliams.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio citratas dihidratas,
benzilo alkoholis,
skystasis parafinas,
polisorbatai 20,
polisorbatai 85,
kalcio alkilbenzeno sulfonatas 2-etilheksanolyje,
išgrynintas vanduo.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Balti plastikiniai buteliukai (PET) su mechaniniais plastikiniais purkštukais po 100 ir 500 ml.
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistas yra toksiškas bitėms, ropliams ir žuvims. Saugoti vandens telkinius nuo užteršimo ir iki 12 val. po gydymo neleisti vaistu gydyti gyvūnų maudyti vandens telkiniuose su žuvimis.
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURTŲ TŪJAS

Bioveta a.s.,
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané,

ekijos Respublika

8. RINKODAROS TEIS S NUMERIS (-IAI)

LT/2/00/1101/001-002

9. RINKODAROS TEIS S SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teis pirm kart suteikta 2000-04-03

Rinkodaros teis paskutin kart atnaujinta 2010-11-07

10. TEKSTO PERŽI ROS DATA

2013 m. rugs jo m n.

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

N ra.

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS*

* informacinis lapelis atskirai nepridedamas, todėl visa informacija pateikiama ant etiketės

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisė turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Bioveta a.s.,
Komenského 212,
68323 Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIO KILL 2,5 mg/ml odos purškalas, emulsija

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml balkšvos emulsijos yra:

veikliosios medžiagos:

permetrino 2,5 mg;

pagalbinės medžiagos:

benzilo alkoholio 10 mg.

4. VAISTO FORMA

Odos purškalas, emulsija.

5. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

500 ml

6. INDIKACIJA (-OS)

Šunys, jūr kiaulytė, žiurkėnė, triušis, egzotiniai paukščiai, arklys, avištinis ir naminis paukščiai, ektoparazitams (blusoms, utėlėms, erkėms) bei vabzdžiams (skruzdėlėms, musėms, vorams) naikinti. Galima naudoti guoliams ir lizdams dezinfekuoti.

7. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti katėms. Vengti bet kokio kontakto su šunimis, kurie buvo gydyti BIO KILL 2,5 mg/ml purškalu.

8. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinoma.

9. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys, jūrkiaulytės, žiurkėnai, triušiai, egzotiniai paukščiai, arkliai, avys, naminiai paukščiai.

10. DOZAVIMAS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudojimo būdas:

Gyvūnų ektoparazitams naikinti vaistą reikia purkšti tiesiai ant kailio ar plunksnų kol sudrėks. Jei gyvūno plaukai ilgi, purškimo metu rekomenduotina šukuoti.

Dozavimas: 10 mg permetrino (4 ml vaisto) 1 kg kūno svorio, t.y., 100 ml buteliuko purkštuko 20 paspaudimų arba 500 ml buteliuko purkštuko 4 paspaudimai 1 kg kūno svorio.

Naudojant patalpose, narvus, guolius, gardus ar tvartus reikia purkšti kol taps drėgnis, t.y., apie 25 ml/m² (100 ml buteliuko purkštuko 125 paspaudimai arba 500 ml buteliuko purkštuko 25 paspaudimai). Prireikus galima purkšti pakartotinai po 1–2 sav.

11. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą suplakiti!

12. IŠLAUKA

Nenumatyta.

Neregistruota naudoti produkcijos gyvūnams.

13. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant buteliuko po „Tinka iki“.

14. SPECIALIEJI NURODYMAI

Vaistas gali dirginti odą ir gleivines. Todėl reikia saugotis, kad vaisto nepatektų ant odos, akių ir gleivinių. Vaistui patekus ant odos ar gleivinių, nedelsiant reikia plauti dideliu kiekiu vandens ir nusivilkinti užterštus drabužius, kurie tiesiogiai liečiasi su oda. Vaistui patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens. Jei pasireiškia dirginimo simptomai (burnos niežėjimas), alerginė reakcija ar sisteminės reakcijos, reikia kreiptis į gydytoją.

Vaistas gali dirginti kvėpavimo takus, todėl jį naudoti galima tik gerai vėdinamoje patalpose.

Atsitiktinai kvėpavus, būtina išėiti į gryną orą. Pasunkėjus kvėpavimui ar pasireiškus sisteminiams poveikiui (galvos svaigimui, galvos skausmui, nuovargiui, smarkiame širdies plakime ir t. t.), reikia kreiptis į gydytoją.

Po vaisto naudojimo rekomenduotina iki 12–24 val. vengti kontakto su gydytais gyvūnais, negalima su jais miegoti. Net ir praėjus šiam laikui, po kontakto su gydytais gyvūnais būtina visada kruopščiai nusiplauti rankas. Būtina saugoti vaikus nuo kontakto su gydytais gyvūnais iki 24 val.

Naudojant vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės (respiratorius, apsauginiai rūbai, akiniai, neopreninės pirštinės). Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas permetrinui, turi vengti slyčio su veterinariniu vaistu.

Vaistas neturėtų tiesiogiai liestis su maistu, geriamuoju vandeniu, vaikų žaislais.

Negalima purkšti akvariumus ar vandens telkinius, nes preparatas toksiškas žuvims, ropliams ir bitėms.

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su juo naudojimu susijusi atliekų naikinimui.

15. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistas yra toksiškas bitėms, ropliams ir žuvims. Saugoti vandens telkinius nuo užteršimo ir iki 12 val. po gydymo neleisti vaistu gydyti gyvūnų maudyti vandens telkiniuose su žuvimis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

16. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {m nuo/metai}

17. TEKSTO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2013 m. rugsėjo mėn.

18. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama be recepto.

19. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

20. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/00/1101/001

LT/2/00/1101/002

21. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}