

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FRONTLINE, užlašinamasis tirpalas katėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

0,5 ml pipetėje yra:

veikliosios medžiagos:

fipronilo 50 mg;

pagalbinių medžiagų:

butilhidroksianizolo 0,1 mg,
butilhidroksitolueno 0,05 mg,
kitų pagalbinių medžiagų iki 0,5 ml.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Katės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Katėms, užsikrėtusioms blusomis (*Ctenocephalides felis*) ir erkėmis (*Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp., *Dermacentor* spp.), gydyti ir profilaktiškai.

Katėms, sergančioms blusų sukeltu alerginiu dermatitu, gydyti ir kontroliuoti.

Katėms, užsikrėtusioms plaukagraužiais, gydyti ir profilaktiškai.

4.3. Kontraindikacijos

Nesant tyrimų duomenų, negalima naudoti kačiukams, jaunesniems nei 8 sav. amžiaus ir (arba) sveriantiems mažiau nei 1 kg.

Negalima naudoti sergantiems (sisteminėmis ligomis, karščiuojant) ar sveikstantiems gyvūnams.

Negalima naudoti triušiams, nes gali pasireikšti nepalankios reakcijos, netgi mirtis.

Nesant tyrimų duomenų, nerekomenduojama naudoti ne paskirties gyvūnų rūšims.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Reikia stengtis, kad vaisto nepatektų į gyvūno akis.

Tik išoriniam naudojimui.

Negalima perdozuoti.

Prieš gydymą gyvūnus būtina tiksliai pasverti.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Būtina užtikrinti, kad vaistas yra lašinamas ant vietos, kurios gyvūnas negali pasiekti laižyti, ir kad gydomi gyvūnai nelaižys vieni kitų.

Nėra duomenų apie produkto efektyvumą kates maudžius ar naudojus šampūną. Tačiau pagal atliktus tyrimus su šunimis, kurie buvo maudyti naudojant šampūną praėjus 2 d. po gydymo, nerekomenduotina maudyti gyvūnų 2 d. po vaisto užlašinimo.

Net ir naudojus vaistą, gali įsisiurbti pavienės erkės, todėl neatmestina, kad esant nepalankioms sąlygoms, jos gali pernešti kai kurias infekcines ligas.

Blusos dažnai apninka gyvūnų krepšius, guolius bei įprastas jų poilsio vietas, tokias kaip kilimai ir minkšti baldai. Intensyvaus užkrėtimo atveju tokias vietas reikia apdoroti tinkamais insekticidais ir reguliariai siurbti.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Vaistas gali dirginti gleivinę ir akis, todėl reikia stengtis, kad jo nepatektų į burną ar akis. Gyvūnai ir žmonės, jautrūs insekticidams ar alkoholiui, turėtų vengti sąlyčio su FRONTLINE užlašinamuoju tirpalu. Saugotis, kad vaisto nepatektų ant pirštų. Taip nutikus, rankas reikia plauti vandeniu su muilu.

Vaistui patekus į akis, jas reikia kruopščiai plauti švariu vandeniu.

Naudojus vaistą būtina plauti rankas.

Rekomenduotina neliesti gydytų gyvūnų, kol vaistas nenudžius, todėl reikia neleisti vaikams žaisti su gydytais gyvūnais, kol vaistas nenudžiūvo. Nerekomenduotina gydyti gyvūnų dienos metu, geriau – anksti vakare. Neseniai gydytiems gyvūnams neleisti miegoti su žmonėmis, ypač vaikais.

Naudojant vaistą, negalima rūkyti, gerti ar valgyti.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Vaisto palaižęs gyvūnas dėl jo pagalbinės medžiagos gali šiek tiek seilėtis.

Ypač retai užlašinimo vietoje pasitaiko trumpalaikės odos reakcijos (odos spalvos pakitimai, vietinis plaukų išslinkimas, niežėjimas, eritema), kai kuriais atvejais pastebėtas stiprus niežėjimas ar nuplikimas. Išimtiniais atvejais pasireiškė padidėjęs seilėtekis, grįžtami neurologiniai simptomai (padidėjęs jautrumas, depresija, nerviniai reiškiniai), vėmimas.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Veterinarinio vaisto saugumas veisiamoms, katingoms katėms ir laktacijos metu įrodytas atliekant tyrimus daug kartų lašinus 3 kartus didesnę nei rekomenduotina didžiausią vaisto dozę.

FRONTLINE, užlašinamąjį tirpalą galima naudoti veisiamoms, katingoms katėms bei laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Nesant saugumo tyrimų, gydyti rekomenduotina ne dažniau kaip kas 4 sav.

Naudojimo metodas: vaistą reikia naudoti išoriškai, užlašinant ant odos.

Dozė: vienos 0,5 ml pipetės turinį reikia užlašinti ant odos tarp menčių.

Naudojimo būdas: pipetę laikant vertikaliai reikia nulaužti jos galiuką. Praskyrus plaukus tarp menčių kol pasimatys oda, reikia priglausti pipetės galą prie odos ir kelis kartus paspaudžiant išspausti visą pipetės turinį, geriau dviejose vietose.

Lašinant pipetės turinį, būtina stengtis, kad turinys lašėtų ne ant kailio, o tiesiai ant odos. Vaistas pasiekis visas gyvūno kūno dalis per 24–48 val. Panaudojus FRONTLINE užlašinamąjį tirpalą, negalima maudyti gyvūnų 48 val.

Viena vaisto dozė neleidžia užsikrėsti blusomis iki 5 sav. Nuo erkių vaistas efektyvus 3–4 sav. Viena vaisto dozė neleidžia užsikrėsti plaukagraužiais iki 42 dienų.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Vieną kartą per mėnesį naudojus penkis kartus didesnę nei rekomenduotina dozę šešis mėnesius iš eilės 8 sav. amžiaus kačiukams ir vyresnėms katėms, sveriančioms apie 1 kg, nebuvo pastebėta nebuvo pastebėta jokio nepalankaus poveikio. Perdozavus kyla pavojus pasireikšti nepalankioms reakcijoms (žr. 4.6 p.). Gydžius gali atsirasti niežulys. Užlašinus per didelį vaisto kiekį, lašinimo vietoje plaukai gali sulipti – tai paprastai išnyksta per 24 val. po gydymo.

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: išorinio naudojimo antiparazitinės medžiagos.
ATCvet kodas: QP53AX15.

Fipronilas yra insekticidinis/akaricidinis preparatas, priklausantis fenilpirazolio grupei. Jis veikia parazitų ląstelių chloridų kanalėlius, susijusius su gama amino sviesto rūgštimi. Blokuodamas jos išsiskyrimą, preparatas sutrikdo chloridų jonų perdavimą per priešsinapsines ir posinapsines membranas, sukelia nekontroliuojamą centrinės nervų sistemos aktyvumą ir vabzdžių bei voragyvių žūtį.

Vaisto veikioji medžiaga yra fipronilas, kuris ypač gerai veikia blusas.

Vaistas veikia ilgai, nes kaupiasi odos riebalinėse liaukose ir per plauko folikulus išsiskiria ant odos bei kailio paviršiaus.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Fipronilas pasižymi insekticidiniu/akaricidiniu poveikiu blusoms (*Ctenocephalides* spp.), o taip pat erkėms (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.) visose jų vystymosi stadijose. Jis taip pat užtikrina apsaugą bei kontrolę prieš užsikrėtimą plaukagraužiais.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Absorbicija

Užlašinus FRONTLINE užlašinamąjį tirpalą, absorbavusio per odą fipronilo kiekis, yra nežymus.

Pasiskirstymas: užlašinus tirpalą, jis iš lašinimo vietos pasiskirsto po visą gyvūno kūno paviršių per 24 val. Fipronilo koncentracijos gradientas gyvūno kailyje pasiskirsto nuo užlašinimo vietos į periferines kūno sritis – strėnas, šonus.

Biotransformacija: *in vitro* tyrimais su subląsteline kepenų frakcija nustatyta, kad pagrindinis fipronilo metabolitas buvo fipronilo sulfono darinys. Tačiau tai gali būti ne tiek svarbu *in vivo*, kadangi fipronilas menkai apsorbuojamas katėms.

Išskyrimas: fipronilo koncentracija kailyje palaipsniui mažėja, po gydymo praėjus 1–2 mėn. pasiekiami maždaug 1 µg/g koncentracija.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Butilhidroksianizolas (E 320), butilhidroksitoluenas (E 321), etanolis.

6.2. Nesuderinamumai

Nėra.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti sausoje vietoje, saugoti nuo šviesos.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Polipropileninės monopipetės su vidiniu poliakrilonitrilo-metakrilato kopolimero sluoksniu po 0,5 ml tirpalo kartoninėse dėžutėse po 1 ar 3 vnt.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

FRONTLINE užlašinamasis tirpalas bei jo talpyklės negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvis ir kitiems vandens organizmams.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29, avenue Tony Garnier
69007 LYON
PRANCŪZIJA

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/00/1213/001-002

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2000-12-28

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2011-05-12

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2020-08-05

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
KARTONINĖ DĖŽUTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FRONTLINE, užlašinamasis tirpalas katėms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

veikliosios medžiagos:

fipronilo 50 mg;

pagalbinių medžiagų:

butilhidroksianizolo 0,1 mg,
butilhidroksitolueno 0,05 mg,
kitų pagalbinių medžiagų iki 0,5 ml.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

3 pipetės po 0,5 ml
1 pipetė po 0,5 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Katėms, užsikrėtusioms blusomis (*Ctenocephalides felis*) ir erkėmis (*Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp., *Dermacentor* spp.), gydyti ir profilaktiškai.

Katėms, sergančioms blusų sukeltu alerginiu dermatitu, gydyti ir kontroliuoti.

Katėms, užsikrėtusioms plaukagraužiais, gydyti ir profilaktiškai.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Lašinti ant odos.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Vaisto sąlytis su gleivine yra pavojingas, todėl prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti sausoje vietoje, saugoti nuo šviesos.
Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.
Vaistas ar jo pakuotės negali patekti į vandens telkinius, nes fipronilas gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29, avenue Tony Garnier
69007 LYON
PRANCŪZIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/00/1213/001
LT/2/00/1213/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŖŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
PIPETĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FRONTLINE

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŖIAGOS (-Ų) KIEKIS

Fipronil 50 mg

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,5 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

[Vaisto lašo, krentančio iš pipetės ant gyvūno odos piktograma, vaizduojanti naudojimo būdą]

5. IŠLAUKA

Išlauka: netaikytina.

6. SERIJOS NUMERIS

{numeris}

7. TINKAMUMO DATA

{mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

[Katės piktograma, vaizduojanti veterinarinį naudojimą]
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS [Katės piktograma, vaizduojanti paskirties gyvūnų rūšį]

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTELIŲ
LIZDUOTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FRONTLINE

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS



3. TINKAMUMO DATA

{mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

{numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

INFORMACINIS LAPELIS
FRONTLINE, užlašinamasis tirpalas katėms

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29, avenue Tony Garnier
69007 LYON
PRANCŪZIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
4 Chemin du Calquet
31100 Toulouse
PRANCŪZIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FRONTLINE, užlašinamasis tirpalas katėms

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

0,5 ml pipetėje yra:

veikliosios medžiagos:

fipronilo 50 mg;

pagalbinių medžiagų:

butilhidroksianizolo 0,1 mg,
butilhidroksitolueno 0,05 mg,
kitų pagalbinių medžiagų iki 0,5 ml.

4. INDIKACIJA (-OS)

Katėms, užsikrėtusioms blusomis (*Ctenocephalides felis*) ir erkėmis (*Rhipicephalus* spp., *Ixodes* spp., *Dermacentor* spp.), gydyti ir profilaktiškai.

Katėms, sergančioms blusų sukeltu alerginiu dermatitu, gydyti ir kontroliuoti.

Katėms, užsikrėtusioms plaukagraužiais, gydyti ir profilaktiškai.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nesant tyrimų duomenų, negalima naudoti kačiukams, jaunesniems nei 8 sav. amžiaus ir (arba) sveriantiems mažiau nei 1 kg.

Negalima naudoti sergantiems (sisteminėmis ligomis, karščiuojant) ar sveikstantiems gyvūnams.

Negalima naudoti triušiams, nes gali pasireikšti nepalankios reakcijos, netgi mirtis.

Nesant tyrimų duomenų, nerekomenduojama naudoti ne paskirties gyvūnų rūšims.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Vaisto palaižęs gyvūnas dėl jo pagalbinės medžiagos gali siek tiek seilėtis.

Ypač retai užlašinimo vietoje pasitaiko trumpalaikės odos reakcijos (odos spalvos pakitimai, vietinis plaukų išslinkimas, niežėjimas, eritema), kai kuriais atvejais pastebėtas stiprus niežėjimas ar nuplikimas. Išimtiniais atvejais pasireiškė padidėjęs seilėtekis, grįžtami neurologiniai simptomai (padidėjęs jautrumas, depresija, nerviniai reiškiniai), vėmimas.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinį gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIAENAI RŪŠIAI

Nesant saugumo tyrimų, gydyti rekomenduotina ne dažniau kaip kas 4 sav.

Naudojimo metodas: vaistą reikia naudoti išoriškai, užlašinant ant odos.

Dozė: vienos 0,5 ml pipetės turinį reikia užlašinti ant odos tarp menčių.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Naudojimo būdas: pipetę laikant vertikaliai reikia nulaužti jos galiuką. Praskyrus plaukus tarp menčių kol pasimatys oda, reikia priglausti pipetės galą prie odos ir kelis kartus paspaudžiant išspausti visą pipetės turinį, geriau dviejose vietose.

Lašinant pipetės turinį, būtina stengtis, kad turinys lašėtų ne ant kailio, o tiesiai ant odos.

Vaistas pasieks visas gyvūno kūno dalis per 24–48 val.

Panaudojus FRONTLINE užlašinamąjį tirpalą, negalima maudyti gyvūnų 48 val.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti sausoje vietoje, saugoti nuo šviesos.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Reikia stengtis, kad vaisto nepatektų į gyvūno akis.

Būtina užtikrinti, kad vaistas yra lašinamas ant vietos, kurios gyvūnas negali pasiekti laižyti, ir kad gydomi gyvūnai nelaižys vieni kitų.

Nėra duomenų apie produkto efektyvumą kates maudžius ar naudojus šampūną. Tačiau pagal atliktus tyrimus su šunimis, kurie buvo maudyti naudojant šampūną praėjus 2 d. po gydymo, nerekomenduotina maudyti gyvūnų 2 d. po vaisto užlašinimo.

Net ir naudojus vaistą, gali įsisiurbti pavienės erkės, todėl neatmestina, kad esant nepalankioms sąlygoms, jos gali pernešti kai kurias infekcines ligas.

Blusos dažnai apninka gyvūnų krepšius, guolius bei įprastas jų poilsio vietas, tokias kaip kilimai ir minkšti baldai. Intensyvaus užkrėtimo atveju tokias vietas reikia apdoroti tinkamu insekticidu ir reguliariai siurbti.

Vaistas gali dirginti gleivinę ir akis, todėl reikia stengtis, kad jo nepatektų į burną ar akis. Gyvūnai ir žmonės, jautrūs insekticidams ar alkoholiui, turėtų vengti sąlyčio su FRONTLINE užlašinamuoju tirpalu. Saugotis, kad vaisto nepatektų ant pirštų. Taip nutikus, rankas reikia plauti vandeniu su muilu.

Vaistui patekus į akis, jas reikia kruopščiai plauti švariu vandeniu.

Naudojus vaistą būtina plauti rankas.

Rekomenduotina neliesti gydytų gyvūnų, kol vaistas nenudžius, neleisti vaikams žaisti su gydytais gyvūnais, kol vaistas nenudžiūvo. Nerekomenduotina gydyti gyvūnų dienos metu, geriau – anksti vakare. Neseniai gydytiems gyvūnams neleisti miegoti su žmonėmis, ypač vaikais.

Naudojant vaistą, negalima rūkyti, gerti ar valgyti.

Veterinarinio vaisto saugumas veisiamoms, katingoms katėms ir laktacijos metu įrodytas atliekant tyrimus daug kartų lašinus 3 kartus didesnę nei rekomenduotina didžiausią vaisto dozę.

FRONTLINE, užlašinamąjį tirpalą galima naudoti veisiamoms, katingoms katėms bei laktacijos metu. Vieną kartą per mėnesį naudojus penkis kartus didesnę nei rekomenduotina dozę šešis mėnesius iš eilės 8 sav. amžiaus kačiukams ir vyresnėms katėms, sveriančioms apie 1 kg, nebuvo pastebėta jokio nepalankaus poveikio. Perdozavus kyla pavojus pasireikšti nepalankioms reakcijoms (žr. 6 p.).

Gydžius gali atsirasti niežulys.

Užlašinus per didelį vaisto kiekį, lašinimo vietoje plaukai gali sulipti – tai paprastai praeina per 24 val. po gydymo.

Tik išoriniam naudojimui.

Negalima perdozuoti.

Prieš gydymą gyvūnus būtina tiksliai pasverti.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Vaistas ar jo pakuotės negali patekti į vandens telkinius, nes fipronilas gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2020-08-05

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

Farmakoterapinė grupė: išorinio naudojimo antiparazitinės medžiagos. ATCvet kodas: QP53AX15. Fipronilas pasižymi insekticidiniu/akaricidiniu poveikiu blusoms (*Ctenocephalides* spp.), o taip pat erkėms (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.) visose jų vystymosi stadijose.

Jis taip pat užtikrina apsaugą bei kontrolę prieš užsikrėtimą plaukagraužiais.