

## VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

### 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims  
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims  
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims  
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims  
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims

### 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:

#### veikliųjų medžiagų:

imidakloprido 100 mg,  
permetrino 500 mg;

#### pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitolueno (E321) 1 mg.

1 pipetėje yra:

Vaisto pavadinimas	Pipetė	Imidaklopridas	Permetrinas	E321
Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims	0,4 ml	40 mg	200 mg	0,4 mg
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims	1,0 ml	100 mg	500 mg	1,0 mg
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims	2,5 ml	250 mg	1250 mg	2,5 mg
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims	4,0 ml	400 mg	2000 mg	4,0 mg
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	6,0 ml	600 mg	3000 mg	6,0 mg

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

### 3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.  
Skaidrus gelsvas arba rusvas tirpalas.

### 4. KLINIKINIAI DUOMENYS

#### 4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Šunys.

Naudoti šuns kūno svorį atitinkančią Advantix užlašinamojo tirpalo pipetę arba jų derinį (žr. 4.9 p.).

## 4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Šunims, užsikrėtusiems blusomis (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai.

Blusos žūsta per dieną po gydymo. Vienas gydymas apsaugo nuo užsikrėtimo blusomis keturias savaites.

Vaistas gali būti naudojamas kaip gydymo strategijos dalis blusų sukeltam alerginiam dermatitui (BAD) kontroliuoti tais atvejais, kai liga jau anksčiau buvo diagnozuota veterinarijos gydytojo.

Šunims, užsikrėtusiems plaukagraužiais (*Trichodectes canis*), gydyti.

Vaistas veikia atbaidančiai ir akaricidiškai, todėl apsaugo nuo užsikrėtimo kraujasiurbėmis erkėmis (keturias savaites nuo *Rhipicephalus sanguineus* ir *Ixodes ricinus*, tris savaites nuo *Dermacentor reticulatus*).

Žudančiai ir atbaidančiai veikdamas ligų sukėlėjus pernešančias erkes (vektorius) *Rhipicephalus sanguineus*, vaistas sumažina patogenų *Ehrlichia canis* pernešimo tikimybę ir tuo pačiu sumažina šunų erlichiozės riziką. Rizikos sumažėjimas, prasidedantis nuo 3 dienų po vaisto užlašinimo ir trunkantis iki 4 savaičių, nustatytas tyrimuose.

Ant šuns jau buvusios erkės gali nežūti per 2 dienas po gydymo, o likti prisitvirtinusios ir būti matomos. Siekiant išvengti erkių prisitvirtinimo ir maitinimosi krauju, gydymo metu ant šuns esančias erkes rekomenduojama pašalinti.

Vienas gydymas veikia atbaidančiai (neleidžia maitintis) smėlines muses (*Phlebotomus papatasi* – dvi savaites, *Phlebotomus perniciosus* – tris savaites), nuo uodų (*Aedes aegypti* – dvi savaites, *Culex pipiens* – keturias savaites), piktmuses (*Stomoxys calcitrans* – keturias savaites).

## 4.3. Kontraindikacijos

Nesant duomenų, vaisto negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 1,5 kg (0,4 ml pipečių), 4 kg (1 ml pipečių), 10 kg (2,5 ml pipečių), 25 kg (4 ml pipečių) arba 40 kg (6 ml pipečių).

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti katėms (žr. 4.5 p. „Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės“).

## 4.4. Specialieji išpėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Naudojant vaistą, viena kita erkė gali prisitvirtinti, uodas ar smėlinė musė gali įgelti.

Dėl šios priežasties šių parazitų pernešamų infekcinių ligų pasireiškimo tikimybė, esant nepalankioms sąlygoms, išlieka.

Rekomenduojama taikyti gydymą mažiausiai 3 dienas prieš numanomą *E. canis* poveikį. Tyrimais su šunims, užsikrėtusiais *Rhipicephalus sanguineus* erkėmis, kurios buvo užsikrėtusios *E. canis*, nustatytas šunų erlichiozės rizikos sumažėjimas, prasidedantis 3 dienas po vaisto užlašinimo ir trunkantis 4 savaites.

## 4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

### Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Būtina stengtis, kad pipetės turinys nepatektų į gydomo gyvūno akis ir (ar) burną.

Būtina stengtis, kad vaistas būtų tinkamai naudojamas, kaip nurodyta 4.9 p. Reikia ypatingai saugoti, kad gydyti ar su jais turintys sąlytį gyvūnai nelaižytų užlašinimo vietas.

Negalima naudoti katėms.



Šis vaistas yra ypač nuodingas katėms ir gali būti mirtinas dėl kačių specifinės fiziologijos, nesugebant metabolizuoti tam tikrų junginių. Vienas tokių junginių yra permetrinas. Norint apsaugoti kates nuo vaisto poveikio, gydytą šunį reikia laikyti atskirai nuo katės, kol neišdžius vaisto užlašinimo vieta. Svarbu užtikrinti, kad katės nelaižytų šuns kailio vaisto užlašinimo vietoje. Taip atsitikus, reikia nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją.

Dėl vaisto naudojimo sergantiems ar nusilpusiems šunims reikia pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.

#### Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būtina vengti, vaisto patekimo ant odos, į akis ar burną.

Naudojimo metu negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus ant odos, reikia nedelsiant plauti muilu ir vandeniui.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas vaisto sudėtinėms dalims, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

Labai retais atvejais galintys pasireikšti vyraujantys klinikiniai simptomai yra trumpalaikės juntamosios odos reakcijos, tokios kaip dilgčiojimas, deginimas ar tirpimas.

Vaisto atsitiktinai patekus į akis, reikia nedelsiant kruopščiai plauti vandeniui.

Jei odos ar akių sudirginimo simptomai nepraeina, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Negalima praryti. Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Gydyto gyvūno geriau neliesti, ypač vaikams, kol neišdžiūvusi vaisto užlašinimo vieta.

Rekomenduojama veterinarinį vaistą naudoti vakare ir neleisti neseniai gydytiems gyvūnams miegoti su šeimininkais, o ypač su vaikais.

Kad pipečių nepasiektų vaikai, iki pat naudojimo jas reikia laikyti originalioje pakuotėje, o sunaudotas nedelsiant išmesti.

#### Kitos atsargumo priemonės

Veterinarinis vaistas yra pavojingas vandens gyvūnams, todėl 48 val. po naudojimo šunų jokia būdu negalima leisti prie paviršinių vandens telkinių.

Advantix sudėtyje esantis tirpiklis gali dažyti tam tikras medžiagas, pvz., odą, tekstilę, plastiką, apdirbtus paviršius. Prieš galimą šuns kontaktą su tokiomis medžiagomis vaisto užlašinimo vieta turi išdžiūti.

#### **4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)**

Labai retais atvejais šunims gali pasireikšti laikini odos jautrumo požymiai (padidėjęs vietinis niežulys, kasymasis ir trynimasis, plaukų slinkimas ir užlašinimo vietos paraudimas) ar mieguistumas.

Labai retais atvejais gali pasikeisti šunų elgesys (pasireikšti susijaudinimas, neramumas, inkštimas ar voliojimas), pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų simptomai (vėmimas, viduriavimas, padidėjęs seilėtekis, sumažėjęs apetitas) ir neurologiniai požymiai, tokie kaip nestabilus judėjimas ir trūkčiojimas, šunims, kurie yra jautrūs permetrinui. Šie požymiai paprastai yra trumpalaikiai ir išnyksta savaime.

Jei gydytas gyvūnas nulaižo vaisto užlašinio vietą, apsinuodijimas yra mažai tikėtinas, bet labai retais atvejais gali pasireikšti. Tokiu atveju galima pastebėti trumpalaikius neurologinius reiškinius, tokius kaip drebulys ir mieguistumas. Taikomas simptominis gydymas. Priešnuodis nežinomas.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

#### 4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

#### 4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

#### 4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Naudoti tik ant odos. Lašinti tik ant nepažeistos odos.

Rekomenduojama mažiausia dozė yra 10 mg imidakloprido ir 50 mg permetrino 1 kg kūno svorio.

*Advantix užlašinamojo tirpalo dozavimo schema*

Šuns svoris	Vaisto pavadinimas	Kiekis (ml)	Imidakloprido dozė (mg/kg)	Permetrino dozė (mg/kg)
≤ 4 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims	0,4	ne mažiau kaip 10	ne mažiau kaip 50
> 4 kg ≤ 10 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims	1,0	10–25	50–125
> 10 kg ≤ 25 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims	2,5	10–25	50–125
> 25 kg ≤ 40 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims	4,0	10–16	50–80
> 40 kg ≤ 60 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	6,0	10–15	50–75

Šunims, sveriantiems daugiau kaip 60 kg, reikia naudoti kelias atitinkamo tūrio pipetes.


Norint išvengti pakartotinio užsikrėtimo, rekomenduojama gydyti visus namuose esančius šunis, taip pat atitinkamomis priemonėmis nuo blusų ir jų lervų apdoroti gyvūnus supančią aplinką.

Vaistas išlieka efektyvus net sušlapinus šuns kailį, tačiau dažnai maudant, ypač kai aplinkoje gausu ektoparazitų, gali prireikti papildomų vaisto dozių, bet ne dažniau kaip kartą per savaitę. Vaisto efektyvumui optimizuoti, šunis rekomenduojama maudyti prieš vaisto naudojimą arba po gydymo praėjus ne mažiau kaip 2 savaitėms.

Užsikrėtimo plaukagraužiais atveju, praėjus 30 dienų po gydymo, rekomenduojama veterinarijos gydytojo apžiūra, nes kai kuriems gyvūnams gali prireikti pakartotinio gydymo.

## *Naudojimo metodas*

Išimti pipetę iš pakuotės. Laikant vertikaliai, pasukti ir nuimti apsauginį dangtelį. Dangtelį apversti ir kitu galu vėl užsukti ant pipetės taip pažeidžiant jos sandarumą.



### Šunims iki 10 kg svorio

Ramiai stovinčiam šuniui praskirti plaukus srityje tarp menčių taip, kad pasimatytų oda. Priglausti pipetės galiuką prie odos ir išspausti visą jos turinį tiesiai ant odos.



### Šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg

Ramiai stovinčiam šuniui pipetės turinį tolygiai paskirstyti keturiose vietose ant nugaros paviršiaus, srityje nuo pečių iki uodegos pagrindo. Kiekvienoje užlašinimo vietoje praskirti plaukus taip, kad matytųsi oda. Priglaudus pipetės galiuką prie odos, atsargiai išspausti dalį tirpalo ant odos. Negalima užpilti didelio kiekio tirpalo vienoje vietoje, nes tirpalas gali nuvarvėti šuniui per šonus.



## **4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina**

Naudojus 5 kartus didesnes nei rekomenduojama dozes sveikiems šuniukams ir suaugusiems šunims bei šuniukams, kurių motinos buvo gydytos 3 kartus didesnėmis dozėmis, nepalankių reiškinių nepastebėta.

## **4.11. Išlauka**

Netaikytina.

## **5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS**

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos išoriniam naudojimui, įskaitant insekticidus. ATCvet kodas: QP53AC54.

ADVANTIX užlašinamajame tirpale yra dvi veikliosios medžiagos – imidaklopridas ir permetrinas. Vaistas veikia kaip insekticidas, akaricidas ir repelentas.

### **5.1. Farmakodinaminės savybės**

**Imidaklopridas** – ektoparazitocidinė medžiaga, priklausanti chloro nikotino junginių grupei, veikianti tiek suaugusius blusas, tiek jų lervas. Be naikamojo poveikio suaugusioms blusoms, imidaklopridas taip pat naikina gydyto gyvūno aplinkoje esančias blusų lervas. Aplinkoje esančios

blusų lervos žūsta po sąlyčio su gydytu gyvūnu. Imidaklopridas pasižymi dideliu afinitetu blusų centrinės nervų sistemos (CNS) posinapsinės srities nikotinerginiams acetilcholino receptoriams. Dėl cholinerginio nervinių impulsų perdavimo slopinimo sukeliama vabzdžių paralyžius ir žūtis.

**Permetrinas** yra I tipo sintetinis piretroidas – insekticidinė ir akaricidinė medžiaga, taip pat veikianti ir atbaidančiai. Piretroidai veikia stuburinių ir nestuburinių gyvūnų įtampos valdomus natrio jonų kanalus. Piretroidai yra vadinamieji „atvirų kanalų blokatoriai“, kurie natrio kanalus veikia slopindami ir aktyvinimą, ir inaktyvinimą, todėl pasireiškia per didelį jaudrumą ir parazitas žūsta.

Nustatyta, kad naudojant abiejų medžiagų derinį, imidaklopridas veikia kaip artropodų ganglijų aktyvintojas ir todėl didina permetrino veiksmingumą.

Vaistas veikia atbaidančiai (neleidžia maitintis) erkes, smėlines muses ir uodus, taip neleidžiamas parazitams pasimaitinti krauju ir tokiu būdu sumažindamas šunų vektorinės kilmės ligų (pvz., boreliozės, riketsiozės, ehrlichiozės, leishmaniozės) pernešimo riziką. Tačiau gali būti pavienių įsisiurbusių erkių ar pavienių smėlinių musių ar uodų įkandimų. Dėl šios priežasties, esant nepalankioms sąlygoms, negalima atmesti šių parazitų pernešamų infekcinių ligų pasireiškimo tikimybės. Vaistas veikia atbaidančiai (neleidžia maitintis) smėlines muses, taip užkirsdamas kelią musių sukeltam dermatitui.

## 5.2. Farmakokinetinės savybės

Vaistas skirtas išoriniam naudojimui ant odos, užlašintas greitai pasiskirsto gyvūno kūno paviršiuje. Abi veikliosios medžiagos išlieka efektyvios ant plaukų ir odos 4 savaites.

Odos tyrimais su žiurkėmis ir šunimis, taip pat perdozavimo ir serumo kinetinėmis tyrimais nustatyta, kad veikliųjų medžiagų sisteminė absorbcija yra menka, laikina ir klinikiniam efektyvumui įtakos neturi.

## Savybės aplinkoje

Veterinarinis vaistas negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvis ir kitiems vandens gyvūnams. Dėl gydytų šunų žr. 4.5 p.  
Permetrinas toksiškas bitėms.

## 6. FARMACINIAI DUOMENYS

### 6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Butilhidroksitoluenas (E321),  
N-metilpirolidonas,  
trigliceridai, vidutinės grandinės,  
citrinų rūgštis (E330; pH sureguliuoti).

### 6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nežinoma.

### 6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalaus aliuminio folijos maišelio:

0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml pipečių – 5 metai, 6 ml pipečių – 3 metai.

Tinkamumo laikas, pažeidus originalų aliuminio folijos maišelį:

0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml pipečių – 24 mėn., 6 ml pipečių – 12 mėn.

Pažeidus originalų folijos maišelį, visas 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml ar 4,0 ml pipetės būtina sunaudoti per 24 mėn., o 6 ml pipetės – per 12 mėn. arba iki tinkamumo laiko, nepažeidus originalaus aliuminio folijos maišelio, pabaigos, jei jis trumpesnis.

Atidarius pirminę pakuotę, veterinarinį vaistą būtina sunaudoti nedelsiant.

#### **6.4. Specialieji laikymo nurodymai**

Negalima sušaldyti.

Atidarius folijos maišelį, laikyti sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

#### **6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys**

Pipetės tūris: 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml, 6,0 ml.

Pipetė: balta polipropileninė pipetė;  
baltas polipropileninis dangtelis.

Antrinė pakuotė: polichlorotrifluoroetileno PCTFE-PVC (0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml) arba polichlorotrifluoroetileno PCTFE-PVC ar PVC (6,0 ml) karščiu užlydytos lizdinės plokštelės, aliuminio folijos maišeliai, kartoninės dėžutės.

Pakuotės dydžiai: pakuotės po 1, 2, 3, 4 ir 6 pipetes.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

#### **6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos**

Panaudojus būtina užsukti dangtelį ant pipetės.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Advantix negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvis ir kitiems vandens organizmams.

### **6. REGISTRUOTOJAS**

Bayer Animal Health GmbH,  
51368 Leverkusen  
Vokietija

### **8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)**

LT/2/04/1608/001-025

### **9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA**

Registravimo data 2004-02-03

Perregistravimo data 2009-02-13

### **10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA**

2018 m. balandžio mėn.

### **DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI**

Nėra.

## ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS**

**KARTONINĖ DĖŽUTĖ (1 IR 4 PIPETĖMS)**

### 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims  
Advantix, užlašinamasis tirpalas >4–10 kg svorio šunims  
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims  
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims  
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims  
*Imidaclopridum/Permethrinum*

### 2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

0,4 ml pipetėje yra:  
veikliųjų medžiagų:  
40 mg imidakloprido, 200 mg permetrino.  
1,0 ml pipetėje yra:  
veikliųjų medžiagų: 100 mg imidakloprido, 500 mg permetrino.  
2,5 ml pipetėje yra:  
veikliųjų medžiagų: 250 mg imidakloprido, 1250 mg permetrino.  
4,0 ml pipetėje yra:  
veikliųjų medžiagų: 400 mg imidakloprido, 2000 mg permetrino.  
6,0 ml pipetėje yra:  
veikliųjų medžiagų: 600 mg imidakloprido, 3000 mg permetrino.

### 3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas

### 4. PAKUOTĖS DYDIS

1 pipetė (1 x 0,4 ml, 1 x 1,0 ml, 1 x 2,5 ml, 1 x 4,0ml, 1 x 6,0 ml)  
2 pipetės (2 x 0,4 ml, 2 x 1,0 ml, 2 x 2,5 ml, 2 x 4,0 ml, 2 x 6,0 ml)  
3 pipetės (3 x 0,4 ml, 3 x 1,0 ml, 3 x 2,5 ml, 3 x 4,0 ml, 3 x 6,0 ml)  
4 pipetės (4 x 0,4 ml, 4 x 1,0 ml, 4 x 2,5 ml, 4 x 4,0 ml, 4 x 6,0 ml)  
6 pipetės (6 x 0,4 ml, 6 x 1,0 ml, 6 x 2,5 ml, 6 x 4,0 ml, 6 x 6,0 ml)

### 5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys

### 6. INDIKACIJA (-OS)

*[Kartoninės dėžutės priekinė dalis]*



- Naikina erkes, blusas ir plaukagraužius.
- Atbaido erkes, uodus, smėlines muses ir piktmuses.

[Kartoninės dėžutės nugarėlė]

- Naikina blusas (gydymui ir profilaktikai); gali būti naudojamas kaip blusų sukkelto alerginio dermatito (BAD) gydymo strategijos dalis.
- Naikina plaukagraužius.
- Naikina ir atbaido erkes; sumažina užsikrėtimo ektoparazitų pernešamomis ligomis (borelioze, riketsioze, erlichioze) riziką.
- Atbaido uodus ir smėlines muses; sumažina užsikrėtimo ektoparazitų pernešamomis ligomis (leišmanioze) riziką.
- Atbaido piktmuses; apsaugo nuo įkandimų sukkelto dermatito.

## 7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

**Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.**

Folijos maišelį su lizdinėmis plokštelėmis laikyti kartoninėje dėžutėje.



0,4 ml



1,0 ml



2,5 ml



4,0 ml



6,0 ml

## 8. IŠLAUKA

## 9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

**Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.**

Negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 1,5 kg.

Negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 4 kg.

Negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 10 kg.

Negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 25 kg.

Negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 40 kg.

**Negalima naudoti katėms.**



## 10. TINKAMUMO DATA

EXP

Pažeidus originalų folijos maišelį, būtina sunaudoti per 24 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis. [0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml ir 4,0 ml pipetėms]

Pažeidus originalų folijos maišelį, būtina sunaudoti per 12 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis. [6,0 ml pipetėms]

#### **11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS**

Negalima sušaldyti.

Atidarius folijos maišelį, laikyti sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

#### **12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

#### **13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

#### **14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“**

Saugoti nuo vaikų.

#### **15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Registruotojas:

Bayer Animal Health GmbH,  
51368 Leverkusen  
Vokietija

Gamintojas:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel  
Vokietija

#### **16. REGISTRUOTOJO NUMERIS (-IAI)**

LT/2/04/1608/001, LT/2/04/1608/002, LT/2/04/1608/003, LT/2/04/1608/004, LT/2/04/1608/005,  
LT/2/04/1608/006, LT/2/04/1608/007, LT/2/04/1608/008, LT/2/04/1608/009, LT/2/04/1608/010,  
LT/2/04/1608/011, LT/2/04/1608/012, LT/2/04/1608/013, LT/2/04/1608/014, LT/2/04/1608/015,  
LT/2/04/1608/016, LT/2/04/1608/017, LT/2/04/1608/018, LT/2/04/1608/019, LT/2/04/1608/020,  
LT/2/04/1608/021, LT/2/04/1608/022, LT/2/04/1608/023, LT/2/04/1608/024, LT/2/04/1608/025.

#### **17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS**

Lot

Kita informacija:

- Išlieka veiksmingas šuniui sušlapus
- Veikia blusų lervas gydytų gyvūnų aplinkoje
- Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ  
PIPETĖ**

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Advantix

**2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS**

100 mg/ml *imidaclopridum*  
500 mg/ml *permethrinum*

**3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)**

0,4 ml  
1,0 ml  
2,5 ml  
4,0 ml  
6,0 ml

**4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)**

**5. IŠLAUKA**

**6. SERIJOS NUMERIS**

Lot

**7. TINKAMUMO DATA**

EXP

**8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“**



≤ 4 kg



> 4 kg ≤ 10 kg



> 10 kg ≤ 25 kg



> 25 kg ≤ 40 kg



> 40 kg ≤ 60 kg



MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advantix

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS



3. TINKAMUMO DATA

4. SERIJOS NUMERIS

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“



0.4 ml  
 $\leq 4$  kg



1.0 ml  
 $> 4$  kg  $\leq 10$  kg



2.5 ml  
 $> 10$  kg  $\leq 25$  kg



4.0 ml  
 $> 25$  kg  $\leq 40$  kg



6.0 ml  
 $> 40$  kg  $\leq 60$  kg



**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ**

**FOLIJOS MAIŠELIS**

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Advantix

**2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS**



**3. TINKAMUMO DATA**

EXP

**4. SERIJOS NUMERIS**

Lot

**5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“**



$\leq 4 \text{ kg}$   
0.4 ml



$> 4 \text{ kg} \leq 10 \text{ kg}$   
1.0 ml



$> 10 \text{ kg} \leq 25 \text{ kg}$   
2.5 ml



$> 25 \text{ kg} \leq 40 \text{ kg}$   
4.0 ml



$> 40 \text{ kg} \leq 60 \text{ kg}$   
6.0 ml



Pažeidus originalų folijos maišelį, būtina sunaudoti per 24 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis. [0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml]

Pažeidus originalų folijos maišelį, būtina sunaudoti per 12 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis. [6 ml]

## INFORMACINIS LAPELIS

Advantix, užlašimasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims  
Advantix, užlašimasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims  
Advantix, užlašimasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims  
Advantix, užlašimasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims  
Advantix, užlašimasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims

### 1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

#### Registruotojas

Bayer Animal Health GmbH,  
51368 Leverkusen  
Vokietija

#### Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324  
24106 Kiel  
Vokietija

### 2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advantix, užlašimasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims  
Advantix, užlašimasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims  
Advantix, užlašimasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims  
Advantix užlašimasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims  
Advantix, užlašimasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims  
Imidaklopridas, permetrinas

### 3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

#### **veikliųjų medžiagų:**

imidakloprido 100 mg,  
permetrino 500 mg;

#### **pagalbinės medžiagos:**

butilhidroksitolueno (E321) 1 mg.

1 pipetėje yra:

<b>Vaisto pavadinimas</b>	<b>Pipetė</b>	<b>Imidaklopridas</b>	<b>Permetrinas</b>	<b>(E321)</b>
Advantix, užlašimasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims	0,4 ml	40 mg	200 mg	0,4 mg
Advantix, užlašimasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims	1,0 ml	100 mg	500 mg	1,0 mg
Advantix, užlašimasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims	2,5 ml	250 mg	1250 mg	2,5 mg
Advantix, užlašimasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims	4,0 ml	400 mg	2000 mg	4,0 mg
Advantix, užlašimasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	6,0 ml	600 mg	3000 mg	6,0 mg

Šunims, sveriantiems daugiau kaip 60 kg, reikia naudoti kelias atitinkamo tūrio pipetes.

Skaidrus gelsvas arba rusvas tirpalas.

#### 4. INDIKACIJOS

Šunims, užsikrėtusiems blusomis (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai.

Blusos žūsta per dieną po gydymo. Vienas gydymas apsaugo nuo užsikrėtimo blusomis keturias savaites.

Vaistas gali būti naudojamas kaip gydymo strategijos dalis blusų sukeltam alerginiam dermatitui (BAD) kontroliuoti tais atvejais, kai liga jau ankščiau buvo diagnozuota veterinarijos gydytojo.

Šunims, užsikrėtusiems plaukagraužiais (*Trichodectes canis*), gydyti.

Vaistas veikia atbaidančiai ir akaricidiškai, todėl apsaugo nuo užsikrėtimo kraujasiurbėmis erkėmis (keturias savaites nuo *Rhipicephalus sanguineus* ir *Ixodes ricinus*, ir tris savaites nuo *Dermacentor reticulatus*).

Žudančiai ir atbaidančiai veikdamas ligų sukėlėjus pernešančias erkes (vektorius) *Rhipicephalus sanguineus*, vaistas sumažina patogenų *Ehrlichia canis* pernešimo tikimybę ir tuo pačiu sumažina šunų erlichiozės riziką. Rizikos sumažėjimas, prasidedantis nuo 3 dienų po vaisto užlašinimo ir trunkantis iki 4 savaičių, nustatytas tyrimuose.

Ant šuns jau buvusios erkės gali nežūti per 2 dienas po gydymo, o likti prisitvirtinusios ir būti matomos. Siekiant išvengti erkių prisitvirtinimo ir maitinimosi krauju, gydymo metu ant šuns esančias erkes rekomenduojama pašalinti.

Vienas gydymas veikia atbaidančiai (neleidžia maitintis) smėlines muses (*Phlebotomus papatasi* – dvi savaites, *Phlebotomus perniciosus* – tris savaites), nuo uodų (*Aedes aegypti* – dvi savaites, *Culex pipiens* – keturias savaites), piktuses (*Stomoxys calcitrans* – keturias savaites).

#### 5. KONTRAINDIKACIJOS

Nesant duomenų, vaisto negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 1,5 kg (0,4 ml pipečių), 4 kg (1 ml pipečių), 10 kg (2,5 ml pipečių), 25 kg (4 ml pipečių) arba 40 kg (6 ml pipečių).

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti katėms (žr. skyrių „Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės“).

#### 6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Labai retais atvejais šunims gali pasireikšti laikini odos jautrumo požymiai (padidėjęs vietinis niežulys, kasymasis ir trynimasis, plaukų slinkimas ir užlašinimo vietos paraudimas) ar mieguistumas.

Labai retais atvejais gali pasikeisti šunų elgesys (pasireikšti susijaudinimas, neramumas, inkštimas ar voliojimas), pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų simptomai (vėmimas, viduriavimas, padidėjęs seilėtekis, sumažėjęs apetitas) ir neurologiniai požymiai, tokie kaip nestabilus judėjimas ir trūkčiojimas, šunims, kurie yra jautrūs perimetrinui. Šie požymiai paprastai yra trumpalaikiai ir išnyksta savaime.



Jei gydytas gyvūnas nulaižo vaisto užlašavimo vietą, apsinuodijimas yra mažai tikėtinas, bet labai retais atvejais gali pasireikšti. Tokiu atveju galima pastebėti trumpalaikius neurologinius reiškinius, tokius kaip drebulys ir mieguistumas. Taikomas simptominis gydymas. Priešnuodis nežinomas.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

## 7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

## 8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Rekomenduojama mažiausia dozė yra 10 mg imidakloprido ir 50 mg permetrino 1 kg kūno svorio.

*Dozavimo schema*

Šuns svoris	Vaisto pavadinimas	Kiekis (ml)	Imidakloprido dozė (mg/kg )	Permetrino dozė (mg/kg )
≤ 4 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims	0,4	ne mažiau kaip 10	ne mažiau kaip 50
> 4 kg ≤ 10 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims	1,0	10–25	50–125
> 10 kg ≤ 25 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims	2,5	10–25	50–125
> 25 kg ≤ 40 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims	4,0	10–16	50–80
> 40 kg ≤ 60 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	6,0	10–15	50–75

Šunims, sveriantiems daugiau kaip 60 kg, reikia naudoti kelias atitinkamo tūrio pipetės.


Norint išvengti pakartotinio užsikrėtimo, rekomenduojama gydyti visus namuose esančius šunis, taip pat atitinkamomis priemonėmis nuo blusų ir jų lervų apdoroti gyvūnus supančią aplinką.

Vaistas išlieka efektyvus net sušlapinus šuns kailį, tačiau dažnai maudant, ypač kai aplinkoje gausu ektoparazitų, gali prireikti papildomų vaisto dozių, bet ne dažniau kaip kartą per savaitę. Vaisto efektyvumui optimizuoti, šunis rekomenduojama maudyti prieš vaisto naudojimą arba po gydymo praėjus ne mažiau kaip 2 savaitėms.

Užsikrėtimo plaukagraužiais atveju, praėjus 30 dienų po gydymo, rekomenduojama veterinarijos gydytoja apžiūra, nes kai kuriems gyvūnams gali prireikti pakartotinio gydymo.

## Naudojimo metodas

Išimti pipetę iš pakuotės. Laikant vertikaliai, pasukti ir nuimti apsauginį dangtelį. Dangtelį apversti ir kitu galu vėl užsukti ant pipetės taip pažeidžiant jos sandarumą.



### Šunims iki 10 kg svorio

Ramiai stovinčiam šuniui praskirti plaukus srityje tarp menčių taip, kad pasimatytų oda. Priglausti pipetės galiuką prie odos ir išspausti visą jos turinį tiesiai ant odos.



### Šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg

Ramiai stovinčiam šuniui pipetės turinį tolygiai paskirstyti keturiose vietose ant nugaros paviršiaus, srityje nuo pečių iki uodegos pagrindo. Kiekvienoje užlašinimo vietoje praskirti plaukus taip, kad matytųsi oda. Priglaudus pipetės galiuką prie odos, atsargiai išspausti dalį tirpalo ant odos. Negalima užpilti didelio kiekio tirpalo vienoje vietoje, nes tirpalas gali nuvarvėti šuniui per šonus.



## 9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Tik išoriniam naudojimui.

Lašinti tik ant nepažeistos odos.

Negalima naudoti didelio kiekio tirpalo vienoje vietoje, kad tirpalas nenuvarvėtų šuniui per šonus.

## 10. IŠLAUKA

Netaikytina.

## 11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Negalima sušaldyti.

Atidarius folijos maišelį, laikyti sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Pažeidus originalų folijos maišelį, būtina sunaudoti per 24 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis (0,4 ml, 1 ml, 2,5 ml ir 4 ml pipetėms).

Pažeidus originalų folijos maišelį, būtina sunaudoti per 12 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis (6 ml pipetėms).

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pipetės, folijos maišelio ar dėžutės po „EXP“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

## 12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

### Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Naudojant vaistą, viena kita erkė gali prisitvirtinti, uodas ar smėlinė musė gali įgelti.

Dėl šios priežasties šių parazitų pernešamų infekcinių ligų pasireiškimo tikimybė, esant nepalankioms sąlygoms, išlieka. Tačiau veterinarinis vaistas pasižymi erkės, smėlinės blusas ir uodus atbaidančiu poveikiu (neleidžia maitintis), taip neleiddamas parazitams pasimaitinti krauju ir tokiu būdu sumažindamas šunų vektorinės kilmės ligų (pvz., boreliozės, riketsiozės, ehrlichiozės, leišmaniozės) pernešimo riziką.

Rekomenduojama taikyti gydymą mažiausiai 3 dienas prieš numanomą *E. canis* poveikį. Tyrimais su šunimis, užsikrėtusiais *Rhipicephalus sanguineus* erkėmis, kurios buvo užsikrėtusios *E. canis*, nustatytas šunų erlichiozės rizikos sumažėjimas, prasidedantis 3 dienas po vaisto užlašavimo ir trunkantis 4 savaites.

### Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Būtina stengtis, kad pipetės turinys nepatektų į gydomo gyvūno akis ir (ar) burną.

Būtina stengtis, kad vaistas būtų tinkamai naudojamas, kaip nurodyta skyriuje „Naudojimo būdas ir metodas“. Reikia ypatingai saugoti, kad gydyti ar su jais turintys sąlytį gyvūnai nelaižytų užlašavimo vietos.

Negalima naudoti katėms.



Šis vaistas yra ypač nuodingas katėms ir gali būti mirtinas dėl kačių specifinės fiziologijos, nesugebant metabolizuoti tam tikrų junginių. Vienas tokių junginių yra permetrinas. Norint apsaugoti kates nuo vaisto poveikio, gydytą šunį reikia laikyti atskirai nuo katės, kol neišdžius vaisto užlašavimo vieta. Svarbu užtikrinti, kad katės nelaižytų šuns kailio vaisto užlašavimo vietoje. Taip atsitikus, reikia nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją.

Dėl vaisto naudojimo sergantiems ar nusilpusiems šunims reikia pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.

### Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būtina vengti vaisto patekimo ant odos, į akis ar burną.

Naudojimo metu negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus ant odos, reikia nedelsiant plauti muilu ir vandeniu.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas vaisto sudėtinėms dalims, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu

Labai retais atvejais galintys pasireikšti vyraujantys klinikiniai simptomai yra trumpalaikės juntamosios odos reakcijos, tokios kaip dilgčiojimas, deginimas ar tirpimas.

Vaisto atsitiktinai patekus į akis, nedelsiant reikia kruopščiai plauti vandeniu.

Jei odos ar akių sudirginimo simptomai nepraeina, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją bei parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Negalima praryti. Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Gydyto gyvūno geriau neliesti, ypač vaikams, kol neišdžiūvusi vaisto užlašinimo vieta. Rekomenduojama veterinarinį vaistą naudoti vakare ir neleisti neseniai gydytiems gyvūnams miegoti su šeimininkais, o ypač su vaikais. Kad pipečių nepasiektų vaikai, iki pat naudojimo jas reikia laikyti originalioje pakuotėje, o panaudojus nedelsiant išmesti.

#### Kitos atsargumo priemonės

Veterinarinis vaistas yra pavojingas vandens gyvūnams, todėl 48 val. po naudojimo šunų jokių būdu negalima leisti prie paviršinių vandens telkinių.

Advantix sudėtyje esantis tirpiklis gali dažyti tam tikras medžiagas, pvz., odą, tekstilę, plastiką, apdirbtus paviršius. Prieš galimą šuns kontaktą su tokiomis medžiagomis vaisto užlašinimo vieta turi išdžiūti.

#### Vaikingumas ir laktacija

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

#### Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

#### Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Naudojus 5 kartus didesnes nei rekomenduojama dozes sveikiems šuniukams ir suaugusiems šunims bei šuniukams, kurių motinos buvo gydytos 3 kartus didesnėmis dozėmis, nepalankių reiškinių nepastebėta.

#### Nesuderinamumai

Nežinoma.

### **13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Panaudojus būtina užsukti dangtelį ant pipetės.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Advantix negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

### **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA**

2018 m. balandžio mėn.

### **15. KITA INFORMACIJA**

Parduodama be recepto.

Advantix, užlašinamasis tirpalas yra ektoparazitocidas, kurio sudėtyje yra imidakloprido ir permetrino. Vaistas veikia kaip insekticidas, akaricidas ir repelentas.

Imidaklopridas veikia suaugusias blusas ir blusų lervas. Be naikinamojo poveikio suaugusioms blusoms, imidaklopridas taip pat naikina gydyto gyvūno aplinkoje esančias blusų lervas. Aplinkoje esančios blusų lervos žūsta po sąlyčio su gydytu gyvūnu.

Pakuotė: pipetės po 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml ir 6,0 ml; pakuotės po 1, 2, 3, 4 ir 6 pipetes. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.