

# VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

## 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas

## 2. KOKYBIN IR KIEKYBIN SUD TIS

100 ml tirpalo yra:

### veikli j medžiag :

L-histidino	100 mg,
L-arginino	400 mg,
L-izoleucino	160 mg,
L-leucino	220 mg,
L-lizino	200 mg,
L-metionino	210 mg,
L-fenilalanino	220 mg,
L-treonino	100 mg,
L-valino	150 mg,
karnitino	200 mg,
natrio acetato	276 mg,
kalio acetato	507 mg,
magnio acetato	30 mg,
vitamino B <sub>1</sub>	15 mg,
nikotinamido	25 mg,
vitamino B <sub>12</sub>	3 mg,
sorbitolio	10 g;

**pagalbini medžiag :** iki 100 ml.

Išsam pagalbini medžiag s raš žr. 6.1 p.

## 3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

## 4. KLINIKINIAI DUOMENYS

### 4.1. Paskirties gyv n r šys

Galvijai, arkliai, avys, ožkos ir kiaul s.

### 4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyv n r šis

Galvijams, arkliams, avims, ožkoms ir kiaul ms gydyti, sutrikus medžiag apykaitai ar mitybai, sveikstant po ligos, sergant ketoze, pasireiškus kepen sutrikimams ar nepakankamumui, apsinuodijus, atsiradus medžiag apykaitos ar energini sutrikim .

### 4.3. Kontraindikacijos

N ra.

#### **4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskir r ši paskirties gyv nams**

N ra.

#### **4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemon s**

Specialios atsargumo priemon s, naudojant vaist gyv nams

N ra.

Specialios atsargumo priemon s asmenims, naudojantiems vaist gyv nams

N ra.

#### **4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)**

Nežinomos.

#### **4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušini d jimo metu**

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

#### **4.8. S veika su kitais vaistais ir kitos s veikos formos**

Nežinoma.

#### **4.9. Doz s ir naudojimo b das**

Vaist , pašildyt iki k no temperat ros, reikia l tai švirkšti ven , pilvo ertm ar po oda (švirkš iant po oda, reikia švirkšti keliose vietose).

Rekomenduotinos doz s:

galvijui, arkliui – 500–1 500 ml tirpalo gyvuliui (1–3 ml/kg k no svorio) per par , 3–5 d.,  
aviai, ožkai, kiaulei – 100–300 ml tirpalo gyvuliui (1–3 ml/kg k no svorio) per par , 3–5 d.

#### **4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemon s, priešnuodžiai)**

Nežinomas.

#### **4.11. Išlauka**

0 par .

### **5. FARMAKOLOGIN S SAVYB S**

Farmakoterapin grup : parenterin s mitybos medžiagos. ATCvet kodas: QB05BA10.

Tai hipertoninis tirpalas, kurio sud tyje yra amino r gš i , elektrolit , vitamin ir energetini medžiag .

Maitinamojo hipertoninio tirpalo amino r gštys ir peptidai yra azoto, angliavandeniai (fruktoz , dekstroz , sorbitolis) – energijos šaltinis, be to, dar yra vitamin ir elektrolit (Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> ir Mg<sup>++</sup>).

## **6. FARMACINIAI DUOMENYS**

### **6.1. Pagalbini medžiagų sąrašas**

Metilo parahidroksibenzoatas, propilo parahidroksibenzoatas, injekcinis vanduo.

### **6.2. Nesuderinamumai**

Nežinomi.

### **6.3. Tinkamumo laikas**

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 2 d.

### **6.4. Specialieji laikymo nurodymai**

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

### **6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys**

II tipo stiklo arba plastikiniai (polipropileningi) buteliukai po 500 ml, užkimšti chlorbutilinių gumos kamščeliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

### **6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikavimo nuostatos**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## **7. RINKODAROS TEISĖS TURTUOJAS**

IZO srl a socio unico  
Via San Zeno, 99/A-25124 Brescia  
ITALIJA

## **8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)**

LT/2/07/1725/001-002

## **9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA**

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2007-02-15

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2012-02-15

## **10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA**

2015-10-07

**DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI**

N ra.

## ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS**

**BUTELIUKAS**

### 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas

### 2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

100 ml tirpalo yra:

**veikliosios medžiagos :**

L-histidino	100 mg,
L-arginino	400 mg,
L-izoleucino	160 mg,
L-leucino	220 mg,
L-lizino	200 mg,
L-metionino	210 mg,
L-fenilalanino	220 mg,
L-treonino	100 mg,
L-valino	150 mg,
karnitino	200 mg,
natrio acetato	276 mg,
kalio acetato	507 mg,
magnio acetato	30 mg,
vitamino B <sub>1</sub>	15 mg,
nikotinamido	25 mg,
vitamino B <sub>12</sub>	3 mg,
sorbitolio	10 g,
pagalbinių medžiagų :	iki 100 ml.

### 3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

### 4. PAKUOTĖS DYDIS

500 ml stiklinis buteliukas

500 ml plastikinis buteliukas

### 5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, arkliai, avys, ožkos ir kiaulės.

### 6. INDIKACIJA (-OS)

Galvijams, arkliams, avims, ožkoms ir kiaulėms gydyti, sutrikus medžiagų apykaitai ar mitybai, sveikstant po ligos, sergant ketoze, pasireiškus kepenų sutrikimams ar nepakankamumui, apsinuodijus, atsiradus medžiagų apykaitos ar energinio sutrikimo.

**7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS**

Vaistą, pašildytą iki kambarinės temperatūros, reikia lėtai švirkšti į veną, pilvo ertmę ar po oda (švirkšti į antrojo po oda, reikia švirkšti keliose vietose).

**8. IŠLAUKA**

Išlauka: 0 par.

**9. SPECIALIEJI SĄLYGOS, JEI REIKIA**

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

**10. TINKAMUMO DATA**

Tinka iki {mėnuo/metai}  
Atidarius būtina sunaudoti per 2 d.

**11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS**

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ  
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI  
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

**14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“**

Saugoti nuo vaikų.

**15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS**

IZO srl a socio unico  
Via San Zeno, 99/A-25124 Brescia  
ITALIJA

**16. RINKODAROS TEIS S NUMERIS (-IAI)**

LT/2/07/1725/001

LT/2/07/1725/002

**17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS**

Serijs { numeris }

**INFORMACINIS LAPELIS**  
**ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas**

**1. RINKODAROS TEIS S TUR TOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIM EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Rinkodaros teis s tur tojas  
IZO srl a socio unico  
Via San Zeno, 99/A-25124 Brescia,  
ITALIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidim  
IZO srl a socio unico  
S.S. 234 km 28.2 27013 Chignolo Po (PV),  
ITALIJA

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas

**3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS**

100 ml tirpalo yra:

**veikli j medžiag :**

L-histidino	100 mg,
L-arginino	400 mg,
L-izoleucino	160 mg,
L-leucino	220 mg,
L-lizino	200 mg,
L-metionino	210 mg,
L-fenilalanino	220 mg,
L-treonino	100 mg,
L-valino	150 mg,
karnitino	200 mg,
natrio acetato	276 mg,
kalio acetato	507 mg,
magnio acetato	30 mg,
vitamino B <sub>1</sub>	15 mg,
nikotinamido	25 mg,
vitamino B <sub>12</sub>	3 mg,
sorbitolio	10 g;

**pagalbini medžiag :** iki 100 ml.

**4. INDIKACIJA (-OS)**

Galvijams, arkliams, avims, ožkoms ir kiaul ms gydyti, sutrikus medžiag apykaitai ar mitybai, sveikstant po ligos, sergant ketoze, pasireiškus kepen sutrikimams ar nepakankamumui, apsinuodijus, atsiradus medžiag apykaitos ar energini sutrikim .



## **5. KONTRAINDIKACIJOS**

N ra.

## **6. NEPALANKIOS REAKCIJOS**

Nežinomos. Pasteb jus bet kok sunk poveik ar kit šiame informaciniame lapelyje nepamin t poveik , b tina informuoti veterinarijos gydytoj .

## **7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS**

Galvijai, arkliai, avys, ožkos ir kiaul s.

## **8. DOZ S, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI**

Vaist , pašildyt iki k no temperat ros, reikia l tai švirkšti ven , pilvo ertm ar po oda (švirkš iant po oda reikia švirkšti keliose vietose).

Rekomenduotinos doz s:

galvijui, arkliui – 500–1 500 ml tirpalo gyvuliui (1–3 ml/kg k no svorio) per par , 3–5 d.,  
aviai, ožkai, kiaulei – 100–300 ml tirpalo gyvuliui (1–3 ml/kg k no svorio) per par , 3–5 d.

## **9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO**

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

## **10. IŠLAUKA**

0 par .

## **11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI**

Saugoti nuo vaik .

Laikyti žemesn je kaip 25 °C temperat roje. Saugoti nuo šviesos.

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius pirmin pakuot , – 2 d.

## **12. SPECIALIEJI NURODYMAI**

N ra.

## **13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ SUNAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi b ti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA**

2015-10-07

## 15. KITA INFORMACIJA

Parduodamas be recepto.

Farmakoterapinė grupė : parenterinės mitybos medžiagos. ATCvet kodas: QB05BA10.

Tai hipertoniškas tirpalas, kurio sudėtyje yra amino rūgščių, elektrolitų, vitaminų ir energetinių medžiagų.