

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

GLUCOSE 25 % SOLUTION WITH METHIONINE, infuzinis tirpalas galvijams, arkliams, šunims ir kat ms

2. KOKYBIN IR KIEKYBIN SUD TIS

500 ml tirpalo yra:

veikli j medžiag :

gliukoz s	125 g,
metionino	19,5 g;

pagalbini medžiag iki 500 ml.

Išsam pagalbini medžiag s raš žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Infuzinis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyv n r šys

Galvijai, arkliai, šunys ir kat s.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyv n r šis

Galvijams, arkliams, šunims ir kat ms organizmo skys iams, energetin ms ir detoksikuojamosioms medžiagoms papildyti.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti, esant hiperglikemijai.

Negalima naudoti, esant kasos nepakankamumui ir acidozei.

Gliukoz s hipertoniinio tirpalo negalima naudoti esant anurijai, galvos ir stuburo smegen hemoragijai.

Negalima maišyti su krauju.

Tos pa ios infuzijos sistemos negalima naudoti perpilant krauj .

Negalima naudoti, padid jus jautrumui veikliajai (-iosioms) medžiagai ar bet kuriai iš pagalbini medžiag .

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskir r ši paskirties gyv nams

Rekomenduotina vaist švirkšti stambi sias venas ir kontroliuoti infuzijos greit . Vaist reikia sušvirkšti vienu metu, be pertraukos, o vaisto liku i daugiau naudoti negalima.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemon s

Specialios atsargumo priemon s, naudojant vaist gyv nams

Žr. 4.4 p.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudojant veterinarinį vaistą, būtina taikyti prastines aseptikos taisykles.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Naudojant vaistą, gali pasireikšti hipokalemija, hipomagnemija ir hipofosfatemija. Hipertoninis gliukozės tirpalas gali dirginti ir sukelti trombininį venų uždegimą.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui vertinus naudos ir rizikos santykį.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vaistą reikia švirkšti į veną:

galvijui, arkliui	500 ml,
kumeliukui, veršeliui	100–200 ml,
šuniui, katei	10–100 ml tirpalo.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Nežinomas.

4.11. Išlauka

0 par.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: parenteriniai angliavandeniai ir aminorūgščių deriniai.
ATCvet kodas: QB05BA10.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Tai hipertoninis tirpalas, kurio sudėtyje yra gliukozės ir acetilmetionino (metionino šaltinio). Tai organizmo skysčių atstatantis energetinis ir detoksikuojamasis tirpalas galvijams, arkliams, šunims ir katėms.

Gliukozė yra natūralus gyvybiškai svarbus angliavandenis, kraujo elementas. Tirpalo leidimas didina glikemiją. Gliukozė mažina azoto išsiskyrimą, lengvina glikogeno kaupimąsi organizme, neleidžia pasireikšti ketozei.

Metioninas yra nepakeičiamoji aminorūgštis, svarbi medžiaga apykaitoje. Abi metionino formos, D ir L, yra veiksmingos žiurkių ir žmogaus organizme. Metioninas yra lipotropinė medžiaga, kuri saugo kepenis nuo riebalų kaupimosi ir stimuliuoja insulino išsiskyrimą kasoje.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Sugirdyta gliukozė aktyvaus transporto keliu yra greitai ir lengvai absorbuojama. Išskirdama energiją, gliukozė organizme virsta anglies dvideginiu ir vandeniu.

Metioninas organizme metabolizuojamas cistein, cistation, cisterin, taurin ir organinius sulfatus. D izomeras *in vivo* virsta L forma.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbini medžiag s rašas

Injekcinis vanduo.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuot s, – 5 metai.
Tinkamumo laikas, atidarius pirmin pakuot , – sunaudoti nedelsiant.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti sausoje vietoje. Saugoti nuo šviesos.

6.5. Pirmin s pakuot s pob dis ir sudedamosios dalys

II tipo stiklo buteliukai po 500 ml, užkimšti chlorbutilini s gumos kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusi atliek naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi b ti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEIS S TUR TOJAS

IZO srl a socio unico,
Via San Zeno 99/A,
25124 Brescia,
Italija

8. RINKODAROS TEIS S NUMERIS (-IAI)

LT/2/08/1789/001

9. RINKODAROS TEIS S SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teis pirm kart suteikta 2008-05-20
Rinkodaros teis paskutin kart atnaujinta 2013-06-03

10. TEKSTO PERŽI ROS DATA

2013-08-06

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

N ra.

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS*

* informacinis lapelis atskirai nepridedamas, todėl visa informacija pateikiama ant etiketės

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINIO PAKUOTINIO

BUTELIUKAS 500 ml

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

GLUCOSE 25 % SOLUTION WITH METHIONINE, infuzinis tirpalas galvijams, arkliams, šunims ir katėms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

500 ml tirpalo yra:

gliukozės	125 g,
metionino	19,5 g.

3. VAISTO FORMA

Infuzinis tirpalas.

4. PAKUOTINIO DYDIS

500 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, arkliai, šunys ir katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Galvijams, arkliams, šunims ir katėms organizmo skysčių išsiskyrimui, energetiniam ir detoksikuojamiesiems medžiagoms papildyti.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Vaistą reikia švirkšti į veną:

galvijui, arkliui	500 ml,
kumeliukui, veršeliui	100–200 ml,
šuniui, katei	10–100 ml tirpalo.

8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 par.

9. SPECIALIEJI SP JIMAI, JEI REIKIA

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti, esant hiperglikemijai.

Negalima naudoti, esant kasos nepakankamumui ir acidozei.

Gliukoz s hipertominio tirpalo negalima naudoti esant anurijai, galvos ir stuburo smegen hemoragijai.

Negalima maišyti su krauju.

Tos pa ios infuzijos sistemos negalima naudoti perpilant krauj .

Negalima naudoti, padid jus jautrumui veikliajai (-iosioms) medžiagai ar bet kuriai iš pagalbini medžiag .

NUORODOS D L TINKAMO NAUDOJIMO

Naudojant veterinarin vaist , b tina taikyti prastines aseptikos taisykles.

Rekomenduotina vaist švirškšti stambiasias venas ir kontroliuoti infuzijos greit . Vaist reikia sušvirškšti vienu metu, be pertraukos, o vaisto liku i daugiau naudoti negalima.

SPECIALIEJI NURODYMAI

Vaikingumo ir laktacijos metu naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui vertinus naudos ir rizikos santyk .

NEPALANKIOS REAKCIJOS

Naudojant vaist , gali pasireikšti hipokalemija, hipomagnemija ir hipofosfatemija.

Hipertoininis gliukoz s tirpalas gali dirginti ir sukelti trombin ven uždegim .

Pasteb jus bet kok sunk ar kit nepamin t poveik , b tina informuoti veterinarijos gydytoj .

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {m nuo/metai}

Atidarius sunaudoti nedelsiant.

11. SPECIALIOS LAIKYMO S LYGOS

Laikyti sausoje vietoje. Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEK NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI B TINA

Atliekos turi b ti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO S LYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama be recepto.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIK “

Saugoti nuo vaik .

**15. RINKODAROS TEIS S TUR TOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIM EEE
ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR
ADRESAS**

Rinkodaros teis s tur tojas
IZO srl a socio unico,
Via San Zeno 99/A,
25124 Brescia,
Italija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidim
Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.,
Via Cassia Nord, 351 53014 Monteroni d' Arbia,
Italija

16. RINKODAROS TEIS S NUMERIS (-IAI)

LT/2/08/1789/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs { numeris }

TEKSTO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2013-08-06

KITA INFORMACIJA

Farmakoterapin grup : parenteriniai angliavandeni ir amino r gš i deriniai.

ATCvet kodas: QB05BA10.

Norint gauti informacijos apie š veterinarin vaist , prašome susisiekti su rinkodaros teis s tur tojo vietiniu atstovu.

UAB „Dimela Lietuva“
Paneri g. 258, Kaunas
LT-48452, Lietuva
Tel. +370 37261015
Faks.+ 370 37323144
El.p. info@dimela.lt