

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FYPRYST 67 mg užlašinamasis tirpalas šunims

2. KOKYBIN IR KIEKYBIN SUD TIS

Vienoje 0,67 ml pipet je yra:

veikliosios medžiagos:

fipronilo 67 mg;

pagalbini medžiag :

butilhidroksianizolo (E320) 0,134 mg;

butilhidroksitolueno (E321) 0,067 mg.

Išsam pagalbini medžiag s raš žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

Šviesiai geltonas tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyv n r šys

Šunys.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyv n r šis

Blusomis (*Ctenocephalides* spp.) ir erk mis (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.) užsikr tusiems šunims gydyti ir užsikr timo profilaktikai.

Šunims, sergantiems blus alerginiu dermatitu (BAD), gydyti ir kontroliuoti.

Plaukagraužiais (*Trichodectes canis*) užsikr tusiems šunims gydyti ir užsikr timo profilaktikai.

4.3. Kontraindikacijos

Kadangi n ra duomen , vaisto negalima naudoti jaunesniems nei 8 savait i amžiaus ir (arba) mažiau nei 2 kg sveriantiems šuniukams.

Negalima naudoti sergantiems (sistemin mis ligomis, karš iuojantiems) ar sveikstantiems gyv nam.

Negalima naudoti triušiams, nes gali sukelti nepalankias reakcijas ar net mirt .

Šis vaistas skirtas šunims. Negalima naudoti kat ms, nes galimas perdozavimas.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskir r ši paskirties gyv nam

Reikia saugoti, kad vaisto nepatekt gyv no akis.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Siekiant sumažinti užkrečiamą ligų pasireiškimo riziką, ant gyvūnų esančias erkės reikia pašalinti prieš vaisto naudojimą.

Vaistą reikia užlašinti tokioje vietoje, kur gyvūnas negalėtų jo nusilaižyti. Taip pat svarbu užtikrinti, kad užlašinus tirpalo gyvūnai nelaižytų vienas kito.

Vaisto efektyvumo tyrimai gyvūnams juos maudant neatlikti, todėl juos prausti ar maudyti nerekomenduotina 2 dienas po vaisto naudojimo ir dažniau nei kartą per savaitę. Prieš vaisto naudojimą gyvūnams galima maudyti minkštinamuoju šampūnu, tačiau jei po vaisto panaudojimo maudoma kas savaitę, nuo blusų apsaugantis poveikis sutrumpėja iki maždaug 5 savaičių. Maudymas kas savaitę 6 savaites vaistiniu 2% chlorheksidino turinčiu šampūnu, vaisto veiksmingumo nuo blusų nepakeičia.

Po vaisto naudojimo 2 dienas šunims negalima leisti maudytis vandens telkiniuose (žr. 6.6 p.). Gali sisiurbti pavieniai erkės, todėl ne manoma užtikrinti, kad nepalankiomis sąlygomis nebus perduodamos infekcinės ligos. Paprastai erkės žuva ir nukrenta nuo gyvūno per 24–48 valandas nuo prikibimo ir kraujo ne siurbia. Garantuoti, kad vaisto veikimo metu neprisikabins pavieniai erkės, negalima.

Blusos dažnai veisiasi naminių gyvūnų krepšiuose, guoliuose ir prastose poilsio vietose, pvz., ant kilimų ir kitam apyvokos daiktams, todėl gausaus užsikrėtimo atveju ir prieš imantis atitinkamą kontrolės priemonę šias vietas reikia nuolat apdoroti tinkamu insekticidiniu preparatu ir išsiurbti.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Šis produktas gali dirginti gleivines ir akis.

Todėl reikia saugotis, kad vaisto nepatektų burnai ir akis.

Žmonėms, kuriems nustatytas padidijęs jautrumas fipronilui ar alkoholiui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu. Reikia saugotis, kad vaisto nepatektų ant pirštų. Jei taip nutinka, rankas reikia nuplauti vandeniu ir muilu.

Vaistui atsitiktinai patekus į akis, jas reikia nedelsiant kruopščiai išplauti paprastu vandeniu.

Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.

Negalima glostyti gydomo gyvūno ir leisti vaikams žaisti su gydomais gyvūnais, kol nenudžiūvo vaisto užlašinimo vieta. Todėl rekomenduojama gyvūnams gydyti ne dieną, bet anksti vakare, o tuoj po gydymo gyvūnams nereikėtų leisti miegoti toje pačioje lovoje su šeimininkais, ypač su vaikais.

Naudojant vaistą, negalima rkyti, gerti ir valgyti.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Jei gyvūnas nulaižo tirpalą, todėl vaisto sudėtyje esančio nešiklio prigimties trumpą laiką gali sustiprėti seilėtekis. Labai retais atvejais tartos šios nepalankios reakcijos (apie jas praneša po vaisto naudojimo): laikinos odos reakcijos užlašinimo vietoje (odos spalvos pokytis, vietinis plaukų išslinkimas, niežulys, paraudimas) ir bendras niežulys bei plaukų išslinkimas. Išimtiniais atvejais po vaisto naudojimo pastebimas seilėtekis, laikini neurologiniai požymiai (hiperestezija, depresija, nervingumo požymiai), vėmimas ar kvėpavimo sutrikimas.

Vengti perdozavimo.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Veterinarinio vaisto saugumas veisiamoms, šuningoms kalvoms bei laktacijos metu patvirtintas, kai kelis kartus iš eilės naudota ne daugiau kaip tris kartus didesnė nei didžiausia rekomenduotina dozė. Fypryst užlašinamąjį tirpalą veisiamoms, šuningoms kalvoms bei laktacijos metu naudoti galima.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozavimas ir naudojimas

Dozavimas

2-10 kg sverianiam šuniui lašinti vienos dozės 0,67 ml užlašinamojo tirpalo pipete.

Tokiu būdu bus panaudota minimali rekomenduotina fipronilo dozė, t. y. 6,7 mg/kg.


Kadangi nėra atlikta saugumo tyrimų, minimalus intervalas tarp gydymo – 4 savaitės.

Gydymas kas mėnesį rekomenduotinas tuo atveju, jei yra didelė pakartotinio užsikrėtimo blusomis rizika, jei šuo alergiškas blusų kandimams, jei būtina apsaugoti nuo užsikrėtimo erkėmis arba jei šuo dažnai maudomas hipoalerginiais ar minkštinamaisiais šampūnais. Vietovėse, kur užsikrėtimo blusomis ir erkėmis rizika nėra didelė, Fypryst užlašinamąjį tirpalą galima naudoti kas antrą ar kas trečią mėnesį.

Naudojimo būdas: naudoti užlašinant ant odos.

Naudojimo metodas

Iš trigubo maišelio išimti vienos dozės pipetę. Laikant ją vertikaliai, pasukti ir nuimti gaubtelį. Apsukti ją ir uždėti kitu galu ant vienos dozės pipetės. Paspausiti ir pasukti gaubtelį, pradurti izoliacinį sluoksnį, tada gaubtelį nuimti nuo vienos dozės pipetės. Praskirti gyvūno kailį ant keturios tarpmenės, kad matytųsi oda. Vienos dozės pipetės galiuką priglausti tiesiai prie odos ir kelis kartus spustelėjus išspausti visą pipetės turinį ant odos.



Šis vaistas nuo užsikrėtimo blusomis apsaugo du mėnesius, erkėmis – ne ilgiau kaip 4 savaites. Poveikio trukmė priklauso nuo parazitų patekimo rizikos, t. y. aplinkos. Blusos žūva per 24 val. nuo patekimo ant gyvūno.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Atliekant vaisto saugumo paskirties gyvūnams tyrimus su 8 savaitėms amžiaus ir vyresniais šuniukais bei auganiais šunimis, sveriančiais 2 kg, buvo skirta dozė, penkis kartus didesnė už rekomenduojamą dozė, nebuvo nustatyta jokių nepalankių reakcijų. Vis dėlto perdozavimo atveju nepalankių reakcijų rizika gali padidėti (žr. 4.6 p.), todėl visada reikia naudoti tinkamo dydžio pipetę (atsižvelgiant į gyvūno kūno svorį).

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinis vietinio naudojimo medžiaga.
ATCvet kodas: QP53AX15.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Fipronilas yra insekticidinis ir akaricidinis fenilpirazol grupės medžiaga. Fipronilas veikia parazitų lizolizės chloridų kanalų ligandus, ypač tuos, kurių veiklą reguliuoja neuroperdavimo gama-amino

sviesto r gštis (GASR). Blokuojamas priešsinapsinis ir posinapsinis chlorid jon perdavimas per l steli membranas, tod l nerv sistemos veikla tampa nekontroliuojama ir vabzdžiai bei voragyviai ž va.

Fypryst užlašinamajame tirpale yra veikliosios medžiagos fipronilo, kuriam b dingas unikalus poveikio blusoms ir erk ms mechanizmas. Fypryst užlašinamasis tirpalas kaupiasi odos ir plauk folikul riebalin se strukt rose ir iš plauk folikul nuolat patenka ant odos ir kailio, tod l pasireiškia ilgalaikis nuolatinis poveikis.

5.2. Farmakokinetinis savyb s

Po vietinio Fypryst užlašinamojo tirpalo panaudojimo šunims per od absorbuojama šiek tiek fipronilo (15 %). Šun kraujo plazmoje nustatyta fipronilo koncentracija b na vairi.

Po Fypryst užlašinamojo tirpalo panaudojimo fipronilas sklinda gyv no kailiu pagal susidarius koncentracijos gradient nuo naudojimo vietos periferines sritis (juosmens srit , šonus).

Šun organizme fipronilas daugiausia metabolizuojamas susidarant sulfonui (RM 1602) , kuris irgi sukelia insekticidin ir akaricidin poveik .

Fipronilo koncentracija šun plaukuose po vaisto panaudojimo maž ja ir pra jus 56 dienoms b na maždaug 3-4 µg/g.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbini medžiag s rašas

Butilhidroksitoluenas (E321),
butilhidroksianizolas (E320),
etanolis (96 %),
polisorbatai 80,
povidonas K25,
dietilenglikolio monoetilo eteris.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuot s, – 3 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti originalioje pakuot je, kad vaistas b t apsaugotas nuo šviesos.
Šiam veterinariniam vaistui speciali laikymo temperat ros s lyg nereikia.

6.5. Pirmin s pakuot s pob dis ir sudedamosios dalys

PP pipet su PE arba POM uždoriu su smaigaliu: vienos doz s pipet s po 0,67 ml užlašinamojo tirpalo trisluoksniuose PETP-AI-MTPE maišeliuose.

D žut se yra 1, 3, 6, 10 arba 20 pipe i .

Gali b ti platinamos ne vis dydži pakuot s.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusi atliek naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Šis veterinarinis vaistas negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

7. RINKODAROS TEIS S TURTŲ TOJAS

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
SLOV NIJA

8. RINKODAROS TEIS S NUMERIS (-IAI)

LT/2/10/1919/001
LT/2/10/1919/005-008

9. RINKODAROS TEIS S SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teis pirm kart suteikta 2010-04-11
Rinkodaros teis paskutin kart atnaujinta 2015-02-03

10. TEKSTO PERŽI ROS DATA

2015-02-03

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINŲ SPAKUOTŲ

D ŽUT

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Fypryst 67 mg užlašinamasis tirpalas šunims
Fipronilas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 0,67 ml pipetėje yra:

veikliosios medžiagos:
fipronilo 67 mg;

pagalbini medžiag:
butilhidroksianizolo (E320) 0,134 mg;
butilhidroksitolueno (E321) 0,067 mg.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTŲ DYDIS

1 vienos dozės 0,67 ml pipetė
3 vienos dozės 0,67 ml pipetės
6 vienos dozės 0,67 ml pipetės
10 vienos dozės 0,67 ml pipetės
20 vienos dozės 0,67 ml pipetės


5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys (2–10 kg).

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.
Naudoti užlašinant ant odos.



8. IŠLAUKA**9. SPECIALIEJI SPŪJIMAI, JEI REIKIA**

Atsitiktinis tirpalo patekimas ant gleivinės ir odos pavojingas. Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {m nuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ SUNAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus. Šis veterinarinis vaistas negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvioms ir kitiems vandens organizmams.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
SLOVENIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/10/1919/005
LT/2/10/1919/001
LT/2/10/1919/006
LT/2/10/1919/007
LT/2/10/1919/008

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALUS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOJIMŲ ETIKET

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Fypyrst 67 mg užlašinamasis tirpalas šunims
Fipronilas

2. VEIKLIOSIOS (-I J) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

67 mg fipronilo


3. KIEKIS (MAS, TIRŠČIAI AR DOZINĖMS) SKAIČIAI

1 vienos dozės 0,67 ml pipet

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Naudoti užlašinant ant odos.

Šunys (2-10 kg)



5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {m nuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.
KRKA

**MINIMAL S DUOMENYS, KURIE TURI B TI ANT MAŽ PIRMINI PAKUO I
PIPET**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Fypryst 67 mg užlašinamasis tirpalas šunims
Fipronilas

2. VEIKLIOSIOS (-I J) MEDŽIAGOS (-) KIEKIS

3. KIEKIS (MAS , T RIS AR DOZI SKAI IUS)

0,67 ml

4. NAUDOJIMO B DAS (-AI)

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {m nuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.
KRKA

INFORMACINIS LAPELIS
FYPRYST 67 mg užlašinamasis tirpalas šunims
FYPRYST 134 mg užlašinamasis tirpalas šunims
FYPRYST 268 mg užlašinamasis tirpalas šunims
FYPRYST 402 mg užlašinamasis tirpalas šunims

1. RINKODAROS TEIS S TUR TOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIM EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teis s tur tojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidim
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
SLOV NIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FYPRYST 67 mg užlašinamasis tirpalas šunims
FYPRYST 134 mg užlašinamasis tirpalas šunims
FYPRYST 268 mg užlašinamasis tirpalas šunims
FYPRYST 402 mg užlašinamasis tirpalas šunims

Fipronilas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 0,67 ml pipet je yra:

veikliosios medžiagos:
fipronilo 67 mg;

pagalbini medžiag :
butilhidroksianizolo (E320) 0,134 mg;
butilhidroksitolueno (E321) 0,067 mg.

Vienoje 1,34 ml pipet je yra:

veikliosios medžiagos:
fipronilo 134 mg;

pagalbini medžiag :
butilhidroksianizolo (E320) 0,27 mg;
butilhidroksitolueno (E321) 0,13 mg.

Vienoje 2,68 ml pipet je yra:

veikliosios medžiagos:
fipronilo 268 mg;

pagalbini medžiag :
butilhidroksianizolo (E320) 0,54 mg;

butilhidroksitolueno (E321) 0,27 mg.

Vienoje 4,02 ml pipet je yra:

veikliosios medžiagos:

fipronilo 402 mg;

pagalbini medžiag :

butilhidroksianizolo (E320) 0,80 mg;

butilhidroksitolueno (E321) 0,40 mg.

4. INDIKACIJA (-OS)

Blusomis (*Ctenocephalides* spp.) ir erkėmis (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.) užsikrėtusiems šunims gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai.

Šunims, sergantiems blusų alerginiu dermatitu (BAD), gydyti ir kontroliuoti.

Plaukagraužiais (*Trichodectes canis*) užsikrėtusiems šunims gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai.

5. KONTRAIKACIJOS

Kadangi nėra duomenų, vaisto negalima naudoti jaunesniems nei 8 savaitėms amžiaus ir (arba) mažiau nei 2 kg sveriantiems šuniukams.

Negalima naudoti sergantiems (sisteminiams ligoniams, karščiuojantiems) ar sveikstantiems gyvūnams.

Negalima naudoti triušiams, nes gali sukelti nepalankią reakciją ar net mirtį.

Šis vaistas skirtas šunims. Negalima naudoti katėms, nes galimas perdozavimas.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Jei gyvūnas nulaižo tirpalą, dėl vaisto sudėtyje esančio nešiklio prigimties trumpą laiką gali sustiprėti seilėtekis. Labai retais atvejais pastebimos šios nepalankios reakcijos (apie jas pranešta po vaisto naudojimo): laikinos odos reakcijos užlašinimo vietoje (odos spalvos pokytis, vietinis plaukų išslinkimas, niežulys, paraudimas) ir bendras niežulys bei plaukų išslinkimas. Išimtiniais atvejais po vaisto naudojimo pastebimas seilėtekis, laikini neurologiniai požymiai (hiperestezija, depresija, nervingumo požymiai), vėmimas ar kvėpavimo sutrikimas.

Vengti perdozavimo.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šioje informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinį gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8. DOZAVIMAS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Dozavimas

2-10 kg sveriančiam šuniui lašinti vienos dozės 0,67 ml užlašinamojo tirpalo pipetės turiniu.

10-20 kg sveriančiam šuniui lašinti vienos dozės 1,34 ml užlašinamojo tirpalo pipetės turiniu.

20-40 kg sveriančiam šuniui lašinti vienos dozės 2,68 ml užlašinamojo tirpalo pipetės turiniu.

Daugiau kaip 40 kg sveriančiam šuniui lašinti vienos dozės 4,02 ml užlašinamojo tirpalo pipetės turiniu.

Daugiau kaip 60 kg sveriančiam šuniui lašinti vienos dozės 4,02 ml užlašinamojo tirpalo pipetės ir reikiamos mažesnės užlašinamojo tirpalo pipetės turinys.

Tokiu būdu bus panaudota minimali rekomenduotina fipronilo dozė, t. y. 6,7 mg/kg.


Kadangi nėra atlikta saugumo tyrimų, minimalus intervalas tarp gydymo – 4 savaitės.

Gydymas kas mėnesį rekomenduotinas tuo atveju, jei yra didelė pakartotinio užsikrėtimo blusomis rizika, jei šuo alergiškas blusų kandimams, jei būtina apsaugoti nuo užsikrėtimo erkėmis arba jei šuo dažnai maudomas hipoalerginiais ar minkštinamaisiais šampūnais. Vietovėse, kur užsikrėtimo blusomis ir erkėmis rizika nėra didelė, Fypryst užlašinamojo tirpalo galima naudoti kas antrą ar kas trečią mėnesį.

Naudojimo būdas: naudoti užlašinant ant odos.

Naudojimo metodas

Iš trigubo maišelio išimti vienos dozės pipetę. Laikant ją vertikaliai, pasukti ir nuimti gaubtelį. Apsukti ją ir uždėti kitu galu ant vienos dozės pipetės. Paspausti ir pasukti gaubtelį, pradurti izoliacinį sluoksnį, tada gaubtelį nuimti nuo vienos dozės pipetės. Praskirti gyvūno kailį ant keturios tarpmeninės, kad matytųsi oda. Vienos dozės pipetės galiuką priglausti tiesiai prie odos ir kelis kartus spustelėjus išspausti visą pipetės turinį ant odos.



Šis vaistas nuo užsikrėtimo blusomis apsaugos du mėnesius, erkėmis – ne ilgiau kaip 4 savaites. Poveikio trukmė priklauso nuo parazit patekimo rizikos, t. y. aplinkos. Blusos žūva per 24 val. nuo patekimo ant gyvūno.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Reikia saugoti, kad vaisto nepatektų gyvūno akis.

Siekiant sumažinti užkrečiamą ligų pasireiškimą riziką, ant gyvūnų esančių erkių reikia pašalinti prieš vaisto naudojimą.

Vaistą reikia užlašinti tokioje vietoje, kur gyvūnas negalėtų jo nusilaižyti. Taip pat svarbu užtikrinti, kad užlašinus tirpalo gyvūnui nelaižyt vienas kito.

Vaisto efektyvumo tyrimai gyvūnams juos maudant neatlikti, todėl juos prausti ar maudyti nerekomenduotina 2 dienas po vaisto naudojimo ir dažniau nei kartą per savaitę. Prieš vaisto naudojimą gyvūnui galima maudyti minkštinamuoju šampūnu, tačiau jei po vaisto panaudojimo maudoma kas savaitę, nuo blusų apsaugantis poveikis sutrumpėja iki maždaug 5 savaičių. Maudymas kas savaitę 6 savaites vaistiniu 2% chlorheksidino turinčiu šampūnu, vaisto veiksmingumo nuo blusų nepakeičia.

Po vaisto naudojimo 2 dienas šunims negalima leisti maudytis vandens telkiniuose (žr. 13 p.).

Gali sisiurbti pavieniai erkės, todėl nerekomenduojama užtikrinti, kad nepalankiomis sąlygomis nebus perduodamos infekcinės ligos. Paprastai erkės žūva ir nukrenta nuo gyvūno per 24–48 valandas nuo prikibimo ir kraujo ne siurbia. Garantuoti, kad vaisto veikimo metu neprisikabins pavienės erkės, negalima.

Blusos dažnai veisiasi naminių gyvūnų krepšiuose, guoliuose ir prastose poilsio vietose, pvz., ant kilimų ir kitų namų apyvokos daiktų, todėl gausaus užsikrėtimo atveju ir prieš imantis atitinkamą kontrolės priemonę šias vietas reikia nuolat apdoroti tinkamu insekticidiniu preparatu ir išsiurbti. Fypryst užlašinamąjį tirpalą veisiamoms, šuningoms kalvoms bei laktacijos metu naudoti galima.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.
Šiam veterinariniam vaistui specialūs laikymo temperatūros sąlygos nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės po EXP.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Šis produktas gali dirginti gleivines ir akis.

Todėl reikia saugotis, kad vaisto nepatektų burnai ir akims.

Žmonės, kuriems nustatytas padidijęs jautrumas fipronilui ar alkoholiui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu. Reikia saugotis, kad vaisto nepatektų ant pirštų. Jei taip nutinka, rankas reikia nuplauti vandeniu ir muilu.

Vaistui atsitiktinai patekus į akis, jas reikia nedelsiant kruopščiai išplauti paprastu vandeniu.

Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.

Negalima glostyti gydomąjį gyvūną ir leisti vaikams žaisti su gydomais gyvūnais, kol nenudžiūvo vaisto užlašinimo vieta. Todėl rekomenduojama gyvūnams gydyti ne dieną, bet anksti vakare, o tuoj po gydymo gyvūnams nereikėtų leisti miegoti toje pačioje lovoje su šeimininkais, ypač su vaikais.

Naudojant vaistą, negalima rkyti, gerti ir valgyti.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, kaip daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

Šis veterinarinis vaistas negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2015-02-03

15. KITA INFORMACIJA

Kartoninėse dėžutėse yra 1, 3, 6, 10 ar 20 vienos dozės pipetės (kiekvienoje 0,67 ml užlašinamojo tirpalo) trisluoksniuose maišeliuose.

Kartoninėse dėžutėse yra 1, 3, 6, 10 ar 20 vienos dozės pipetės (kiekvienoje 1,34 ml užlašinamojo tirpalo) trisluoksniuose maišeliuose.

Kartonin se d žut se yra 1, 3, 6, 10 ar 20 vienos doz s pipe i (kiekvienoje 2,68 ml užlašinamojo tirpalo) trisluoksniuose maišeliuose.

Kartonin se d žut se yra 1, 3, 6, 10 ar 20 vienos doz s pipe i (kiekvienoje 4,02 ml užlašinamojo tirpalo) trisluoksniuose maišeliuose.

Gali b ti platinamos ne vis dydži pakuot s.

Farmakoterapin grup : ektoparazitocidin s vietinio naudojimo medžiagos. ATCvet kodas: QP53AX15.

Fipronilas yra insekticidin ir akaricidin fenilpirazol grup s medžiaga. Fipronilas veikia parazit l steli chlorid kanal li ligandus, ypa tuos, kuri veikt reguliuoja neuroperdav jas gama-amino sviesto r gštis (GASR). Blokuojamas priešsinapsinis ir posinapsinis chlorid jon perdavimas per l steli membranas, tod l nerv sistemos veikla tampa nekontroliuojama ir vabzdžiai bei voragyviai ž va.

Fypyrst užlašinamajame tirpale yra veikliosios medžiagos fipronilo, kuriam b dingas unikalus poveikio blusoms ir erk ms mechanizmas. Fypyrst užlašinamasis tirpalas kaupiasi odos ir plauk folikul riebalin se strukt rose ir iš plauk folikul nuolat patenka ant odos ir kailio, tod l pasireiškia ilgalaikis nuolatinis poveikis.

Po vietinio Fypyrst užlašinamojo tirpalo panaudojimo šunims per od absorbuojama šiek tiek fipronilo (15 %). Šun kraujo plazmoje nustatyta fipronilo koncentracija b na vairi.

Po Fypyrst užlašinamojo tirpalo panaudojimo fipronilas sklinda gyv no kailiu pagal susidarius koncentracijos gradient nuo naudojimo vietos periferines sritis (juosmens srit , šonus).

Šun organizme fipronilas daugiausia metabolizuojamas susidarant sulfonui (RM 1602) , kuris irgi sukelia insekticidin ir akaricidin poveik .

Fipronilo koncentracija šun plaukuose po vaisto panaudojimo maž ja ir pra jus 56 dienoms b na maždaug 3-4 µg/g.