

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Glucose – Lösung 40 % Bernburg, infuzinis tirpalas arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims, katėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

gliukozės monohidrato 440 mg (atitinka 400 mg bevandenės gliukozės);

pagalbinių medžiagų iki 1 ml.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Infuzinis tirpalas.

Skaidrus, be matomų nuosėdų, bespalvis ar balkšvai gelsvas, bekvapis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Arkliai, galvijai, avys, ožkos, kiaulės, šunys, katės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti atvejais, kai reikia daug kalorijų turinčių angliavandenių, esant hipoglikemijai, norint iš dalies ar pilnai kompensuoti angliavandenių trūkumą organizme, taip pat esant acetonemijai.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti, esant hiperglikemijai, hiperhidracijai, acidozei, hipokalemijai, hipotoninei dehidracijai.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Privaloma stebėti gliukozės kiekį kraujyje.

Rekomenduojama stebėti elektrolitų ir skysčių balansą.

Stebėti dėl hiponatremijos.

Nenumatyta osmoterapijai.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Nėra.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinoma.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Nežinoma.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Naudojant su kitais vaistais, būtina atkreipti dėmesį, kad tirpalo pH yra 3,5–5,5. Maišant su kitais vaistais, gali atsirasti nuosėdų.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Švirkšti lėtai į veną, jei įmanoma, naudojant intraveninę lašinę, arba į pilvo ertmę. Dozuojama pagal kalorijų ir skysčių poreikį ir neviršijant numatyto kiekio:

	ml/kg kūno svorio/val.	ml/kg kūno svorio/d.
Kūno svoris iki 2 kg	3,0	70
Kūno svoris 2–5 kg	2,5	55
Kūno svoris 5–20 kg	2,0	40
Kūno svoris 20–100 kg	1,5	30
Kūno svoris daugiau nei 100 kg	0,8	15

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Nenurodyta.

4.11. Išlauka

0 parų.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: tirpalai parenterinei mitybai, angliavandeniai.

ATCvet kodas: QB05BA03.

Gliukozės 40 % infuzinis tirpalas yra angliavandenių kiekį ir skysčius atstatantis tirpalas.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Injekcinis vanduo.

6.2. Nesuderinamumai

Nėra.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant.
Naudoti galima tik skaidrius tirpalus originalioje pakuotėje.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Stikliniai buteliai po 500 ml, užkimšti butilo gumos kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais, kartoninėse dėžėse po 10 vnt.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Serumwerk Bernburg AG
Hallesche Landstrasse 105b
06406 Bernburg
VOKIETIJA

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/10/1937/001

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2010-06-30
Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2015-06-18

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2015-06-18

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS**

**KARTONINĖ DĖŽĖ (10 x 500 ml)
BUTELIS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Glucose – Lösung 40 % Bernburg, infuzinis tirpalas arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims, katėms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

gliukozės monohidrato

440,0 mg (atitinka 400 mg bevandenės gliukozės);

pagalbinių medžiagų

iki 1 ml.

3. VAISTO FORMA

Infuzinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

500 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai, galvijai, avys, ožkos, kiaulės, šunys, katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti atvejais, kai reikia daug kalorijų turinčių angliavandenių, esant hipoglikemijai, norint iš dalies ar pilnai kompensuoti angliavandenių trūkumą organizme, taip pat esant acetonemijai.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}
Atidarius būtina sunaudoti nedelsiant.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Saugoti nuo vaikų.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Serumwerk Bernburg AG,
Hallesche Landstrasse 105b
06406 Bernburg
VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/10/1937/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs

INFORMACINIS LAPELIS

Glucose – Lösung 40 % Bernburg, infuzinis tirpalas arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims, katėms

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Serumwerk Bernburg AG
Hallesche Landstrasse 105b
06406 Bernburg
VOKIETIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Glucose – Lösung 40 % Bernburg, infuzinis tirpalas arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims, katėms

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

gliukozės monohidrato

440,0 mg (atitinka 400 mg bevandenės gliukozės);

pagalbinių medžiagų

iki 1 ml.

4. INDIKACIJA (-OS)

Arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti atvejais, kai reikia daug kalorijų turinčių angliavandenių, esant hipoglikemijai, norint iš dalies ar pilnai kompensuoti angliavandenių trūkumą organizme, taip pat esant acetonemijai.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti, esant hiperglikemijai, hiperhidracijai, acidozei, hipokalemijai, hipotoninei dehidracijai.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinoma.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai, galvijai, avys, ožkos, kiaulės, šunys, katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Švirkšti lėtai į veną, jei įmanoma, naudojant intraveninę lašinę, arba į pilvo ertmę.
Dozuojama pagal kalorijų ir skysčių poreikį ir neviršijant numatyto kiekio:

	ml/kg kūno svorio/val.	ml/kg kūno svorio/d.
Kūno svoris iki 2 kg	3,0	70
Kūno svoris 2–5 kg	2,5	55
Kūno svoris 5–20 kg	2,0	40
Kūno svoris 20–100 kg	1,5	30
Kūno svoris daugiau nei 100 kg	0,8	15

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Naudoti galima tik skaidrius tirpalus originalioje pakuotėje.

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Privaloma stebėti gliukozės kiekį kraujyje.

Rekomenduojama stebėti elektrolitų ir skysčių balansą.

Stebėti dėl hiponatremijos.

Nenumatyta osmoterapijai.

Naudojant su kitais vaistais, būtina atkreipti dėmesį, kad tirpalo pH yra 3,5–5,5.

Maišant su kitais vaistais, gali atsirasti nuosėdų.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2015-06-18

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama be recepto.

Pakuotė: stikliniai buteliai po 500 ml.