

# VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

## 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FIPRON 50 mg užlašinamasis tirpalas katėms

## 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 tūbelėje (0,5 ml) yra:

### veikliosios medžiagos:

fipronilo 50 mg;

### pagalbinių medžiagų:

butilhidroksianizolo (E320) 0,10 mg,

butilhidroksitolueno (E321) 0,05 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

## 3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

Skaidrus, nuo geltonos iki geltonai žalios spalvos tirpalas.

## 4. KLINIKINIAI DUOMENYS

### 4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Katės.

### 4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Katėms, užsikrėtusioms blusomis (*Ctenocephalides felis*), gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai, taip pat naudotinas esant blusų įkandimų sukeltam alerginiam dermatitui (FAD) ir jo profilaktikai. Katėms, užsikrėtusioms erkėmis (*Ixodes* spp., *Rhipicephalus* spp.) ir plaukagraužiais (*Felicola subrostratus*), gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai.

### 4.3. Kontraindikacijos

Dėl duomenų trūkumo negalima naudoti jaunesniems nei 8 savaičių amžiaus ir (arba) mažesnio nei 1 kg svorio kačiukams.

Negalima naudoti sergantiems (sisteminėmis ligomis, karščiuojantiems) arba sveikstantiems gyvūnams.

Negalima naudoti triušiams. Galimos nepalankios reakcijos ar net mirtis.

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai arba bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

### 4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Vengti vaisto patekimo į gyvūno akis.

Norint išvengti galimo parazitų atsparumo veikliajai medžiagai rizikos ir su tuo susijusio mažesnio gydymo veiksmingumo, reikia laikytis šių ektoparazitocidinių medžiagų naudojimo taisyklių:

- vengti pernelyg anksti ir pakartotinai naudoti tos pačios grupės ektoparazitocidines medžiagas;

- laikytis nurodytų dozių ir dozavimo režimo. Vaistą naudoti gamintojo rekomenduotomis dozėmis, kad būtų užtikrintas optimalus gydymasis poveikis.

#### 4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

##### Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Svarbu užtikrinti, kad vaistas būtų užlašintas tokioje vietoje, kur gyvūnas negalėtų jo nusilaižyti, o taip pat neleisti gyvūnams laižyti vienas kito. Vaistą naudoti tik ant odos paviršiaus. Nenaudoti per burną arba parenteriniu būdu. Vengti vaisto užlašinimo ant gleivinių (į akis, į šnerves, ant lytinių organų gleivinių ir ant vietų, kur yra pažeista oda).

Nustačius užsikrėtimą blusomis, rekomenduojama tuo pat metu atlikti ir kitų kartu gyvenančių gyvūnų gydymą ektoparazitocidinėmis medžiagomis.

Nerekomenduojama 2 dienas po vaisto naudojimo gyvūno maudyti arba plauti su šampūnu, o taip pat maudyti dažniau nei vieną kartą per savaitę.

**Kai kurios erkės gali įsisiurbti jau panaudojus vaistą, tačiau jos žūsta per 24–48 valandas po vaisto naudojimo. Tai paprastai įvyksta erkei dar nepradėjus itin stipriai siurbti, kas labai sumažina, tačiau pilnai nepanaikina užsikrėtimo erkių pernešamomis ligomis rizikos.**

Blusos dažnai veisiasi gyvūnų krepšiuose, guoliuose ir poilsio vietose, pvz., kilimuose, minkštuose balduose, kuriuos gausaus užkrėtimo atvejais bei kontrolės priemonių taikymo pradžioje reikia apdoroti tinkamais insekticidais ir reguliariai siurbti dulkių siurbliu.

##### Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems veterinarinį vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas fipronilui ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Vengti vaisto patekimo ant pirštų. Taip nutikus, reikia rankas nusiplauti vandeniu su muilu.

Vaistas gali dirginti akis ir gleivines. Todėl reikia stengtis, kad vaistas nepatektų į burną ir akis.

Vaistui atsitiktinai patekus į akis, jas reikia nedelsiant kruopščiai plauti vandeniu.

Jei dirginimas nepraeina, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Neliesti gydytų gyvūnų ir neleisti vaikams žaisti su jais, kol neišdžius vaisto užlašinimo vieta. Todėl rekomenduojama negydyti gyvūnų dienos metu, bet atlikti tai anksti vakare, o neseniai gydytiems gyvūnams neleisti miegoti su šeimininkais, ypač su vaikais.

Naudojant vaistą negalima rūkyti, gerti ar valgyti. Po naudojimo nusiplauti rankas.

##### Kitos atsargumo priemonės

Fipronilas gali būti pavojingas vandens organizmams. 2 dienas po vaisto naudojimo negalima leisti katėms maudytis vandens telkiniuose.

Vaistas gali turėti neigiamą poveikį dažytiems, lakuotiems ir kitiems buitiniams paviršiams bei baldams.

#### 4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Gyvūnui nulaižius vaistą, dėl vaisto sudėtyje esančio nešiklio savybių gali trumpam padidėti seilėtekis.

Tarp labai retai po vaisto naudojimo pasitaikiusių nepalankių reakcijų buvo trumpalaikės užlašinimo vietoje pastebėtos odos reakcijos (alopecija, niežulys, eritema, pleiskanojimas) ir bendras niežėjimas arba plaukų slinkimas. Išimtiniais atvejais buvo pastebėtas padidėjęs seilėtekis, grįžtamieji neurologiniai simptomai (hiperestezija, depresija, nervingumas) ir vėmimas.

Užlašinimo vietoje gali atsirasti kosmetinių defektų (sulipę plaukai, baltos dėmės).

Vengti perdozavimo.

Ilgesnį laiką trunkančių nepalankių reakcijų atveju reikia kreiptis į veterinarijos gydytoją.

#### 4.7. Naudojimas vaikingumo ir laktacijos metu

Vaisto saugumas buvo patikrintas naudojant veisiamoms ir vaikingoms katėms bei katėms laktacijos metu, kelis kartus duodant tris kartus didesnę už rekomenduojamą vaisto dozę.

Vaistą galima naudoti veisiamoms ir vaikingoms katėms bei katėms laktacijos metu.

#### **4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos**

Nežinoma.

#### **4.9. Dozės ir naudojimo būdas**

Nesant duomenų mažiausias laikotarpis tarp dviejų naudojimū yra 4 savaitės.

Naudojimo būdas: užlašinti.

Dozės:

vienos 0,5 ml tūbelės turinį užlašinti ant odos tarp menčių.

Naudojimo būdas:

tūbelę laikyti kakliuku aukštyn ir kelis kartus pastuksenti pirštu į kakliuką. Sukamuoju judesiu atsargiai nulaužti jos galiuką. Praskirti plaukus tarp gyvūno menčių taip, kad matytųsi oda. Tūbelės galiuką priglausti prie odos ir kelis kartus paspausti tūbelę taip, kad visas turinys išbėgtų tiesiai ant odos.

Viena dozė užtikrina apsaugą nuo užsikrėtimo blusomis 5 savaitių laikotarpiu. Vaistas apsaugo nuo užsikrėtimo erkėmis 3–4 savaitių laikotarpiu.

Blusų *Ctenocephalides felis* sukkelto alerginio dermatito atveju rekomenduojama vaistą naudoti pakartotinai 4 savaitių intervalais.

#### **4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina**

Vaisto saugumas paskirties gyvūnams patvirtintas laboratoriniais tyrimais. Laboratoriniai tyrimai buvo atliekami su kačiukais (8 savaitių amžiaus) ir su maždaug 1 kg svorio katėmis. Naudotoji dozė buvo penkis kartus didesnė už rekomenduojamą dozę. Tyrimais nebuvo nustatyta jokių nepalankių reakcijų. Perdozavimo atveju gali padidėti nepalankių reakcijų atsiradimo rizika (žr. 4.6 p.), todėl gyvūnams visada reikia naudoti tinkamo dydžio tūbelę, parinktą pagal gyvūno svorį.

#### **4.11. Išlauka**

Netaikytina.

### **5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS**

Farmakoterapinė grupė: kiti vietinio naudojimo ektoparazitocidai.

ATCvet kodas: QP53AX15.

#### **5.1. Farmakodinaminės savybės**

Fipronilas yra plataus spektro insekticidas-akaricidas, priklausantis fenilpirazolų grupei. Nariuotakojams jis yra toksiškas po sąlyčio su kūno paviršiumi arba vaistą nurijus. Jis veikia suaugusius ir lervų stadijos parazitus. Vabzdžių centrinėje nervų sistemoje jis sąveikauja su gama-amino sviesto rūgšties (GABA) receptoriais, kurie reguliuoja chloridinius kanalėlius. Tokiu būdu fipronilas blokuoja chlorido jonų perėjimą per ląstelių membranas. Tai sukelia per didelę nervų stimuliaciją, nekoordinuotą nervų sistemos veiklą ir galiausiai vabzdžių ir voragyvių žūtį. Akaricidinių poveikį taip pat lemia naikinantis poveikis erkių seilių liaukoms, dėl ko erkės nebegali siurbti gyvūno kraujo. Erkių patelėms nustatytas fipronilo toksiškumas reprodukcijai (negrįžtami oocitų pokyčiai).

#### **5.2. Farmakokinetinės savybės**

Užlašinus vaistą, veiklioji medžiaga absorbuojasi į gyvūno odos viršutinius sluoksnius. Pagal koncentracijos gradientą ji plinta nuo užlašinimo vietos link periferijos (į juosmens sritį, šonus ir t. t.), kaupiasi odos riebaliniame sluoksnyje ir plaukų folikuluose, iš kur palaiptams atsipalaiduoja į odą ir

plaukus. Taip užtikrinamas ilgalaikis šios medžiagos aktyvumas. Taikant vietinio naudojimo būdą, fipronilas neabsorbuojamas į apatinius odos sluoksnius ar į audinius po oda.

## **6. FARMACINIAI DUOMENYS**

### **6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas**

Butilhidroksianizolas (E 320),  
butilhidroksitoluenas (E 321),  
povidonas K-16,5,  
polisorbatas 80,  
etanolis 96 %,   
dietilenglikolio monoeteris.

### **6.2. Nesuderinamumai**

Netaikytina.

### **6.3. Tinkamumo laikas**

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.  
Atidarius paketėlį, sunaudoti nedelsiant.

### **6.4. Specialieji laikymo nurodymai**

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.  
Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.  
Laikyti sausoje vietoje.

### **6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys**

Skaidri vienos dozės tūbelė iš PE su nulaužiamu galiuku (PE). Tūbelės po vieną sudėtos į užlydytą paketėlį (PET-Al-PE). Paketėliai po to yra sudėti į kartoninę dėžutę.

Pakuotės dydis: 1, 3 arba 25 tūbelės po vieną dozę.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

### **6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Vaistas neturi patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Vaistu arba tuščiomis jo pakuotėmis negalima teršti tvenkinių, vandentakių ar kanalų.

## **7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS**

Bioveta, a.s.  
Komenského 212/12  
683 23 Ivanovice na Hané  
Čekijos Respublika

**8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)**

LT/2/16/2358/001-003

**9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA**

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2016-07-14.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2017-03-10.

**10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA**

2017-03-10

## ŽENKLINIMAS

### DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

{ALU paketėlis 0,5 ml tūbelėi; kartoninė dėžutė 1 x 0,5 ml, 3 x 0,5 ml, 25 x 0,5 ml}

### 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FIPRON 50 mg užlašinamasis tirpalas katėms  
Fipronilas

### 2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 tūbelėje (0,5 ml) yra:

**veikliosios medžiagos:**

fipronilo 50 mg;

**pagalbinių medžiagų:**

butilhidroksianizolo (E320) 0,10 mg,

butilhidroksitolueno (E321) 0,05 mg.

### 3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

### 4. PAKUOTĖS DYDIS

1 vienos dozės tūbelė

3 vienos dozės tūbelės

25 vienos dozės tūbelės

### 5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

### 6. INDIKACIJA (-OS)

Katėms, užsikrėtusioms blusomis (*Ctenocephalides felis*), gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai, taip pat naudotinas esant blusų įkandimų sukeltam alerginiam dermatitui (FAD) ir jo profilaktikai. Katėms, užsikrėtusioms erkėms (*Ixodes* spp., *Rhipicephalus* spp.) ir plaukagraužiais (*Felicola subrostratus*), gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai.

### 7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Užlašinti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

**8. IŠLAUKA**

Netaikytina.

**9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA**

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

**10. TINKAMUMO DATA**

Tinka iki {mėnuo/metai}  
Atidarius paketėlį, sunaudoti nedelsiant.

**11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS**

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.  
Laikyti sausoje vietoje.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ  
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI  
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

**14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“**

Saugoti nuo vaikų.

**15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Bioveta, a.s.  
Komenského 212/12  
683 23 Ivanovice na Hané  
Čekijos Respublika

**16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)**

LT/2/16/2358/001  
LT/2/16/2358/002  
LT/2/16/2358/003

**17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS**

Serijs {numeris}

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ**

{0,5 ml tūbelė}

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

FIPRON 50 mg užlašinamasis tirpalas katėms  
Fipronilas

**2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS**

Bioveta, a.s.

**3. TINKAMUMO DATA**

Tinka iki {mėnuo/metai}

**4. SERIJOS NUMERIS**

Seriya {numeris}

**5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“**

Tik veterinariniam naudojimui.

**INFORMACINIS LAPELIS**  
FIPRON 50 mg užlašinamasis tirpalas katėms

**1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Bioveta, a.s.  
Komenského 212/12  
683 23 Ivanovice na Hané  
Čekijos Respublika

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

FIPRON 50 mg užlašinamas tirpalas katėms  
Fipronilas

**3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS**

1 tūbelėje (0,5 ml) yra:

**veikliosios medžiagos:**

fipronilo 50 mg;

**pagalbinių medžiagų:**

butilhidroksianizolo (E320) 0,10 mg;

butilhidroksitolueno (E321) 0,05 mg.

Skaidrus, nuo geltonos iki geltonai žalios spalvos užlašinamasis tirpalas.

**4. INDIKACIJA (-OS)**

Katėms, užsikrėtusioms blusomis (*Ctenocephalides felis*), gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai, taip pat naudotinas esant blusų įkandimų sukeltam alerginiam dermatitui (FAD) ir jo profilaktikai. Katėms, užsikrėtusioms erkėms (*Ixodes* spp., *Rhipicephalus* spp.) ir plaukagraužiais (*Felicola subrostratus*), gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai.

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Dėl duomenų trūkumo negalima naudoti jaunesniems nei 8 savaičių amžiaus ir (arba) mažesnio nei 1 kg svorio kačiukams.

Negalima naudoti sergantiems (sisteminėmis ligomis, karščiuojantiems) arba sveikstantiems gyvūnams.

Negalima naudoti triušiams. Galimos nepalankios reakcijos ar net mirtis.

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai arba bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

**6. NEPALANKIOS REAKCIJOS**

Gyvūnui nulaužius vaistą, dėl vaisto sudėtyje esančio nešiklio savybių gali trumpam padidėti seilėtekis.

Tarp labai retai po vaisto naudojimo pasitaikiusių nepalankių reakcijų buvo trumpalaikės užlašinimo vietoje pastebėtos odos reakcijos (plaukų išslinkimas, niežulys, paraudimas, pleiskanojimas) ir bendras niežėjimas arba plaukų slinkimas. Išimtiniais atvejais buvo pastebėtas padidėjęs seilėtekis, grįžtamieji neurologiniai simptomai (hiperestezija, depresija, nervingumas) ir vėmimas.

Užlašinimo vietoje gali atsirasti kosmetinių defektų (sulipę plaukai, baltos dėmės).

Vengti perdozavimo.

Ilgesnį laiką trunkančių nepalankių reakcijų atveju reikia kreiptis į veterinarijos gydytoją.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

## **7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS**

Katės.

## **8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI**

Nesant duomenų mažiausias laikotarpis tarp dviejų naudojamų yra 4 savaitės.

Naudojimo būdas: užlašinti.

Dozės:

vienos 0,5 ml tūbelės turinį užlašinti ant odos tarp menčių.

Naudojimo būdas:

tūbelę laikyti kakliuku aukštyn ir kelis kartus pastuksenti pirštu į kakliuką. Sukamuoju judesiu atsargiai nulaužti jos galiuką. Praskirti plaukus tarp gyvūno menčių taip, kad matytųsi oda. Tūbelės galiuką priglauti prie odos ir kelis kartus paspausti tūbelę taip, kad visas turinys išbėgtų tiesiai ant odos.

## **9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO**

Viena dozė užtikrina apsaugą nuo užsikrėtimo blusomis 5 savaitių laikotarpiu. Vaistas apsaugo nuo užsikrėtimo erkėmis 3–4 savaitių laikotarpiu.

Blusų *Ctenocephalides felis* sukkelto alerginio dermatito atveju rekomenduojama vaistą naudoti pakartotinai 4 savaitių intervalais.

## **10. IŠLAUKA**

Netaikytina.

## **11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI**

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Laikyti sausoje vietoje.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti, praėjus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės.

Atidarius paketėlį, sunaudoti nedelsiant.

## 12. SPECIALIEJI NURODYMAI

### Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vengti vaisto patekimo į gyvūno akis.

Svarbu užtikrinti, kad vaistas būtų užlašintas tokioje vietoje, kur gyvūnas negalėtų jo nusilaižyti, o taip pat neleisti gyvūnams laižyti vienas kito. Vaistą naudoti tik ant odos paviršiaus. Nenaudoti per burną arba parenteriniu būdu. Vengti vaisto užlašinimo ant gleivinių (į akis, į šnerves, ant lytinių organų gleivinių ir ant vietų, kur yra pažeista oda).

Nustačius užsikrėtimą blusomis, rekomenduojama tuo pat metu atlikti ir kitų kartu gyvenančių gyvūnų gydymą ektoparazitocidinėmis medžiagomis.

Nerekomenduojama 2 dienas po vaisto naudojimo gyvūno maudyti arba plauti su šampūnu, o taip pat maudyti dažniau nei vieną kartą per savaitę.

**Kai kurios erkės gali įsisurbti jau panaudojus vaistą, tačiau jos žūsta per 24–48 valandas po vaisto naudojimo. Tai paprastai įvyksta erkei dar nepradėjus itin stipriai siurbti, kas labai sumažina, tačiau pilnai nepanaikina užsikrėtimo erkių pernešamomis ligomis rizikos.**

Blusos dažnai veisiasi gyvūnų krepšiuose, guoliuose ir poilsio vietose, pvz., kilimuose, minkštuose balduose, kuriuos gausaus užkrėtimo atvejais bei kontrolės priemonių taikymo pradžioje reikia apdoroti tinkamais insekticidais ir reguliariai siurbti dulkių siurbliu.

### Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas fipronilui ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Vengti vaisto patekimo ant pirštų. Taip nutikus, reikia rankas nusiplauti vandeniu su muilu.

Vaistas gali dirginti akis ir gleivines. Todėl reikia stengtis, kad vaistas nepatektų į burną ir akis.

Vaistui atsitiktinai patekus į akis, jas reikia nedelsiant kruopščiai plauti vandeniu.

Jei dirginimas nepraeina, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Neliesti gydytų gyvūnų ir neleisti vaikams žaisti su jais, kol neišdžius vaisto užlašinimo vieta. Todėl rekomenduojama negydyti gyvūnų dienos metu, bet atlikti tai anksti vakare, o neseniai gydytiems gyvūnams neleisti miegoti su jų šeimininkais, ypač su vaikais.

Naudojant vaistą negalima rūkyti, gerti ar valgyti. Po naudojimo nusiplauti rankas.

### Kitos atsargumo priemonės

Fipronilas gali būti pavojingas vandens organizmams. 2 dienas po vaisto naudojimo negalima leisti katėms maudytis vandens telkiniuose.

Vaistas gali turėti neigiamą poveikį dažytiems, lakuotiems ir kitiems buitiniams paviršiams bei baldams.

### Vaikingumas ir laktacija

Vaisto saugumas buvo patikrintas naudojant veisiamoms ir vaikingoms katėms bei katėms laktacijos metu, kelis kartus duodant tris kartus didesnę už rekomenduojamą vaisto dozę.

Vaistą galima naudoti veisiamoms ir vaikingoms katėms bei katėms laktacijos metu.

### Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

### Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Vaisto saugumas paskirties gyvūnams patvirtintas laboratoriniais tyrimais. Laboratoriniai tyrimai buvo atliekami su kačiukais (8 savaičių amžiaus) ir su maždaug 1 kg svorio katėmis. Naudotoji dozė buvo penkis kartus didesnė už rekomenduojamą dozę. Tyrimais nebuvo nustatyta jokių nepalankių reakcijų. Perdozavimo atveju gali padidėti nepalankių reakcijų atsiradimo rizika (žr. 6 p.), todėl gyvūnams visada reikia naudoti tinkamo dydžio pipetę, parinktą pagal gyvūno svorį.

### Specialios atsargumo priemonės

Dėl galimo gyvūnų judėjimo vietų užkrėtimo blusomis šias vietas reikia reguliariai apdoroti tinkamu insekticidu.

Norint išvengti galimo parazitų atsparumo veikliajai medžiagai rizikos ir su tuo susijusio mažesnio gydymo veiksmingumo, reikia laikytis šių ekto parazitocidinių medžiagų naudojimo taisyklių:  
- vengti pernelyg anksti ir pakartotinai naudoti tos pačios grupės ekto parazitocidines medžiagas;  
- laikytis nurodytų dozių ir dozavimo režimo. Vaistą naudoti gamintojo rekomenduotomis dozėmis, kad būtų užtikrintas optimalus gydomasis poveikis.

### **13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Vaistas neturi patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Vaistu arba tuščiomis jo pakuotėmis negalima teršti tvenkinių, vandentakių ar kanalų.

### **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA**

2017 m. sausio mėn.

### **15. KITA INFORMACIJA**

Pakuotės dydis: 1, 3 arba 25 vienos dozės tūbelės.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodamas be recepto.